

Le Picocheur

*Bulletin de la Société d'observation de la faune ailée du Sud-Ouest
C.P. 1231, Succursale A, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6S1
Août 2012 volume XXIII numéro 2*

S
O
F
A



MOT DU PRÉSIDENT

Nous débutons la vingt-et-unième année de la parution de notre journal interne. En juillet 1991, il avait pour titre « À travers les jumelles »; il s'appelle maintenant « Le Picocheur ».

Un événement spécial est organisé par le Regroupement Québec-Oiseaux, le 15 septembre 2012 : le congrès des ornithologues amateurs du Québec. Le site du regroupement vous renseignera (www.quebecoiseaux.org)

La SOFA vous demande de remplir des feuillets EPOQ cela nous rapporte de petits dollars. On peut le faire par internet au (www.oiseauxqc.org/feuilleter).

Comme d'habitude nous vous avons planifié des activités pour l'automne. Il y aura deux conférences : une qui a pour titre « Nourrir les oiseaux » (cela veut tout dire) et une sur les oiseaux de Californie (un petit voyage).

La Réserve nationale de faune du lac Saint-François, à Dundee, a connu un achalandage monstre dû à la présence des grues du Canada, des pygargues à tête blanche mais aussi d'un nid de gobemouche gris-bleu sur le sentier de la digue aux aigrettes.

Denis Gervais
Président



Gobemouche gris-bleu

photo : Régis Fortin

Le bécasseau à échasses

Ce texte est en grande partie tiré du site d'Environnement Canada (www.ec.gc.ca/w)

Description :

En plumage nuptial, le Bécasseau à échasses a le dos et les ailes marbrés de brun, de crème et de noir. De chaque côté de la tête, il a une tache rousse plus ou moins foncée. Les pattes sont longues et verdâtres, le bec est noir, assez long et légèrement courbé. En plumage hivernal, le dessus est grisâtre, les plumes étant finement liserées de blanc ; le cou, la poitrine et les flancs sont striés, le cou et la poitrine étant de couleur chamois alors que les flancs sont blancs. Les jeunes sont sombres dessus avec un contraste entre la pointe (noirâtre) et la base (brune) des plumes des couvertures et des scapulaires. Le cou, la poitrine et les flancs sont semblables à ceux des adultes en hiver. A tout âge, cette espèce présente un long sourcil blanc. Le mâle et la femelle sont semblables.

Le Bécasseau à échasses mesure entre 18 et un peu plus de 23 centimètres.

Son poids peut varier entre 40 et un peu plus de 65 grammes.

Le Bécasseau à échasses fait partie de la famille des Scolopacidés.

Les yeux des scolopacidés sont plus petits. Ils utilisent plutôt les sensations tactiles de leur bec pour dénicher leur proie.

Le Bécasseau à échasses fait partie de l'ordre des charadriiformes.

Les charadriiformes sont en fait des oiseaux échassiers.

Habitat :

Le Bécasseau à échasses vit autant dans les endroits secs que les endroits humides. On le voit en milieu marécageux, mais aussi dans les champs où l'herbe est courte.

Alimentation :

Le Bécasseau à échasses se nourrit de plantes aquatiques, de larves d'insectes, de petits mollusques, de crustacés, de petites grenouilles et même parfois de graines.

Reproduction :

Le nid est dans une dépression. En effet le mâle creuse des trous dans le sol. Ensuite la femelle choisira la dépression pour y établir son nid. Le nid est fabriqué avec des feuilles et des herbes. Le nid servira plus d'une fois et même quelques années.

La femelle pond généralement 4 oeufs. Les oeufs seront couvés par les deux parents pendant une période d'une vingtaine de jours. Il est à noter que la femelle couvera pendant la journée et le mâle couvera pendant la nuit. Les petits dépendront de leurs parents jusqu'à ce qu'ils prennent leur envol une vingtaine de jours plus tard.

Répartition :

Le Bécasseau à échasses niche dans la toundra détrempée des régions subarctiques et du Bas-Arctique de l'Amérique du Nord. Certains individus passent l'hiver dans les régions côtières, au nord aussi loin que la Caroline du Sud, mais la plupart hiverne dans les prairies de l'intérieur de l'Amérique du Sud.

Situation et tendance au Québec :

Les relevés effectués pendant la migration d'automne semblent indiquer une baisse importante de l'abondance du Bécasseau à échasses au Canada depuis 1970 environ, mais la fiabilité de ces résultats a été jugée faible. La responsabilité du Canada quant à cette espèce est très élevée, car il représente un pourcentage important de la population reproductrice mondiale.

