Le Picocheur

Bulletin de la Société d'observation de la faune ailée du Sud-Ouest
C.P. 1231, Succursale A, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6S1
Septembre 2014 volume XXV numéro 2

MOT DU PRÉSIDENT

Pas de mot du président cette fois mais la photographie du président

Jaseur d'Amérique dans un sureau rouge

N'oubliez pas le décompte de Noël…

La sterne Caspienne

Ce texte est tiré en grande partie du site internet de conservation-nature (http://www.conservation-nature.fr/)

Description :

La Sterne caspienne (Sterna caspia) est un oiseau de la famille des Sternidés. Cet oiseau, avec une envergure allant jusqu'à 145 cm, est la plus grande des sternes du globe. Les deux sexes sont identiques. En été, les adultes ont le manteau et les ailes gris pâle, plus foncé à l'extérieur des primaires, formant une pointe sombre sous l'aile en vol. La tête est blanche, avec le front, la calotte et la nuque noirs. Le dessous du corps et la queue sont blancs. Le bec est puissant, pointu, rouge avec le bout noir. Les pattes sont noires. Elle garde toute l'année sa calotte, son front et sa nuque noirs. Les juvéniles sont assez semblables aux adultes en hiver, mais avec des taches foncées d'un bout à l'autre des couvertures sur les ailes, et sur la queue. La tête a des marques sombres. Les pattes sont rose foncé.

Habitat :

Les habitats de reproduction et d'hivernage de cette espèce sont similaires. La Sterne caspienne fréquente les estuaires, les criques, les baies, les lagons mais aussi les zones humides, les grands lacs, les grandes rivières ou encore les réservoirs d'eau. Pendant la période de reproduction, elle montre une préférence pour les plages de sable ou de galets, les dunes de sable, les rochers plats, les récifs à l'abri ou encore les îles avec une végétation clairsemée. La Sterne caspienne est un hôte typique des lagunes lors de sa migration. Elle profite des ressources halieutiques importantes des lagunes pour se nourrir et se repose sur des îlots ou des digues, souvent en compagnie d'autres laridés.

Comportement :

La sterne caspienne se nourrit en planant sur l'eau, et en plongeant dans les bancs de poissons près de la surface. Quand elle voit un poisson, elle plane au-dessus de lui et plonge dans l'eau pour le poursuivre, souvent complètement immergée. Les crustacés sont attrapés de la même manière. Elle pratique le piratage en volant la nourriture des autres oiseaux.

Par rapport aux autres espèces de sterne, la sterne caspienne n'est pas grégaire en dehors de la période de reproduction. Lors de la reproduction, l'espèce est coloniale mais on peut toutefois noter l'isolement de certains couples ou de petits groupes de 2 à 3 couples. Les couples solitaires nichent souvent dans des colonies mixtes avec d'autres espèces de sternes, des mouettes, des goélands ou des cormorans. L'espèce est très agressive en période de reproduction pour défendre son nid ou les juvéniles. L'espèce est migratrice dans la plupart des pays de l'ouest du paléarctique. La phase de dispersion commence juste après l'envol des jeunes fin juillet-début août et se poursuit jusqu'au mois d'octobre. Elle hiverne en Afrique occidentale et parfois autour de la Méditerranée. Elle migre en partie au dessus des terres, en suivant les cours d'eau du continent européen et traverse l'ouest du Sahara. La migration printanière a lieu entre mars et mai, selon le même trajet qu'à l'aller. À l'automne, les Sternes caspiennes qui nichent dans les Grands Lacs et dans le golfe du Saint-Laurent se dispersent le long de la côte atlantique et passeront l'hiver sur les côtes du golfe du Mexique et dans les îles de la mer des Caraïbes.

Alimentation :

Le régime alimentaire de la Sterne caspienne est composé principalement de poissons, mais elle peut s'alimenter aussi d'invertébrés. Habituellement, elle se nourrit seule ou en couple, mais lorsque les eaux sont riches en poisson, la sterne peut s'alimenter en groupes avec d'autres espèces (sternes ou mouettes). Ils peuvent rechercher de la nourriture jusqu'à 60 km de leur site de reproduction. Elle s'alimente notamment de truites, de saumons, d'anguilles, de maquereaux,… Elle peut occasionnellement s'alimenter d'œufs et de jeunes oiseaux, mais aussi de criquets. Les jeunes sont nourris de poisson.

Dans la région des Grands Lacs, les principales proies sont le Gaspareau et l'Éperlan arc-en-ciel. On a déjà signalé des Perchaudes et des Crapets. Nous ne connaissons pas les habitudes alimentaires de la Sterne caspienne qui niche dans le golfe du Saint-Laurent.

Reproduction : La sterne caspienne est monogame et niche soit en solitaire, soit en colonies, sur le sable ou les plages rocailleuses, ou occasionnellement dans les marais. La période de reproduction de l'espèce commence dès la mi-mai. Les deux parents construisent le nid en creusant une dépression peu profonde dans le sol, tapissée d'algues, de mousse, de végétation marine et de brins d'herbes. Le nid peut-être dissimulé entre les rochers ou les branches mortes.

La femelle y dépose 1 à 4 oeufs rosés, tachés de brun. L'incubation dure de 20 à 27 jours et est assurée par le couple. Les jeunes ont leur plumage complet au bout de 30 ou 40 jours. Les deux parents les nourrissent pendant plus de sept mois après l'éclosion. C'est la plus longue période de nourrissage observée chez les sternes.

Il n'y a qu'un seul site reconnu où l'espèce niche régulièrement au Québec, soit le refuge d'oiseaux migrateurs de l'île à la Brume situé sur la Basse-Côte-Nord. Les relevés d'effectifs d'oiseaux marins qui y sont effectués depuis 1925 révèlent que la taille de cette colonie (qui a déjà accueilli 45 couples en 1930 et 1945) a considérablement diminué, et que l'espèce n'y niche maintenant que de façon sporadique.

Répartition :

La sterne caspienne est assez rare partout. Elle habite tous les continents, sauf l'Amérique du Sud et l'Antarctique. La population européenne se concentre autour de la mer Baltique et en Ukraine. Les populations les plus grandes d'Amérique du Nord se rencontrent dans les Prairies canadiennes. Son seul site de nidification océanique est l'atoll d'Aldabra dans l'ouest de l'océan Indien.

On ne compte qu'environ 50 000 couples (pour 180 000 à 320 000 individus), car l'oiseau niche surtout en colonie et sa répartition reste très localisée. En Europe la population est estimée entre 4700 et 9300 couples.

La Sterne caspienne se reproduit en colonies dispersées dans l'ensemble du Canada, de la côte pacifique de la Colombie-Britannique à la côte atlantique de Terre-Neuve. Les recensements effectués au sein de plusieurs colonies importantes font état d'une augmentation de l'abondance de la Sterne caspienne au Canada, depuis environ 1970. Toutefois, l'information provenant de certaines des colonies les plus grandes des Prairies canadiennes est incomplète.

Menaces :

L'espèce est menacée par la perte et la dégradation de son habitat de reproduction. Souvent les colonies sont éphémères, étant très sensibles aux dérangements humains, notamment durant la première partie de la période d'incubation. A l'avenir, elle pourra aussi être menacée par la perte de son habitat dû aux inondations causées par la montée du niveau des mers. D'autres problèmes fréquemment observés sont la baisse de disponibilité des poissons dont l'espèce se nourrit ainsi que la prédation de la part des corbeaux, mouettes et, à quelques endroits, du vison d'Amérique (Mustela vison). La sterne caspienne est également sensible à la pollution et au phénomène de bioaccumulation des contaminants (organochlorés) dans les poissons ce qui a tendance à engendrer une baisse du succès de reproduction de l'espèce.

Quoique les perturbations d'origine humaine et les contaminants menacent la Sterne caspienne, sa population ne semble pas actuellement en péril, en Amérique du Nord du moins.

Photo : Alain Quenneville

Où et quand observer la sterne caspienne sur le territoire de la SOFA :

La sterne caspienne est un visiteur rare dans la région du Suroît mais il est possible de l'observer à chaque année de la mi-juillet à la fin de septembre là où les laridés des autres espèces se rassemblent. Des endroits comme les Îles-de-la-Paix, sur le lac Saint-Louis, qui sont visibles à partir du bout des rues MacDonald et Jean-Cauvier à Beauharnois (secteur Maple Grove). Des endroits comme la carrière Meloche à LesCèdres qui est située au bout de la montée Saint-Dominique. Et des endroits comme les rochers des rapides situés juste en face du site historique du fort de Coteau-du-lac à Coteau-du-lac.

Bienvenue!

La SOFA est fière d'accueillir un nouveau membre joignant nos rangs.

Danielle Deschamps

AIDEZ-NOUS À RECRUTER DE NOUVEAUX MEMBRES

Vous connaissez un ami, un parent qui cherche une activité de plein air à un prix abordable? Pourquoi ne pas lui parler de la SOFA!

Seul ou en famille, la SOFA lui propose de partir à la découverte du merveilleux monde des oiseaux en compagnie de guides qualifiés. Se joindre à un club d'ornithologie lui permettra également de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts et d'échanger sur une foule de sujets reliés à la nature, la faune et la flore.

COUPON D'ABONNEMENT À LA SOFA

NOM : _____ TÉLÉPHONE : ( ) _____

ADRESSE : _____ CODE POSTAL : _____

VILLE : _____ COURRIEL : _____

NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE : _____ (Coût annuel de 25 $)

Veuillez nous faire parvenir cette fiche d'adhésion ainsi que votre chèque à l'adresse suivante :

SOFA, C.P. 1231, SUCC. A
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC) J6S 6S1

Les faits saillants du printemps et du début de l'été 2014

La fraîcheur de la fin du mois d'avril s'est poursuivie en mai et malgré quelques journées chaudes au cours du mois, la température moyenne est demeurée sous les normales saisonnières. Les températures de juin n'ont pas été très élevées non plus, il a fallu attendre le mois de juillet pour avoir les premiers jours de vraie chaleur. Ce temps chaud s'est maintenu presque tout le mois ensuite, malgré quelques journées dans les normales de saison, le temps frais est revenu au mois d'août et semble annoncer un automne assez froid et pluvieux.

Grue du Canada

Trois individus ont été vus régulièrement, dès le 3 avril, dans le marais du sentier de la digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs). Le 7 avril, sept individus ont été vus au même endroit (plusieurs observateurs). Le 19 avril, deux des grues de la réserve ont été observées en parade nuptiale (plusieurs observateurs). Le 22 avril, un des individus a été observé sur un nid contenant deux œufs. Ce nid était situé de l'autre côté du canal, pratiquement en face de la cache la plus près du stationnement, sensiblement au même endroit où un nid avait été observé les trois années précédentes. Le 21 mai, un poussin a été observé avec deux adultes près du nid. Par la suite, les grues ont été vues à plusieurs reprises, dans la partie plus marécageuse du site, à partir de la cache située dans la section boisée du sentier de la digue aux aigrettes (plusieurs observateurs).

Grande aigrette

Elles ont été observées régulièrement, d'avril à juillet, à Sainte-Martine, au bout de la rue Mac-Donald à Maple-Grove ainsi qu'aux marais de Saint-Timothée et de Saint-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs observateurs). Elles ont fait leur apparition, dès le 31 mars, dans le marais du sentier de la digue aux aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee.

Petit blongios

Ils ont été entendus et vus régulièrement, du début du mois de mai jusqu'à fin d'août, dans les aménagements de Canards Illimités du marais de Saint-Timothée (plusieurs observateurs).

Sterne caspienne

Plusieurs individus (jusqu'à 5) ont été observés en juin et juillet, au bout de la rue Mac-Donald à Maple-Grove ainsi qu'aux environs du quai de Melocheville. Trois individus ont été observés régulièrement en juillet et août, dans l'archipel d'Akwesane sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs). Jusqu'à 12 individus ont été observés, posés sur les rochers des rapides situés juste en face du site historique de Côteau-du-lac (plusieurs observateurs).

Grèbe esclavon

Quatre individus en plumage nuptial ont été observés le 2 mai sur le lac Saint-François à la hauteur de Saint-Zotique (J.C).

Pygargue à tête blanche

De juin à août deux adultes ont été observés régulièrement en vol et perchés dans les arbres en bordure du canal de Beauharnois à Valleyfield (plusieurs observateurs). Ces derniers sont soupçonnés de nicher dans le marais de Saint-Timothée, probablement dans un vieux nid de grand héron difficilement visible de la piste cyclable.

Faucon pèlerin

Deux couples nicheurs ont été observés, de mars à juin, un sur le pont de Saint-Louis-de-Gonzaque à Saint-Timothée et un autre sur le pont Larocque à Valleyfield (plusieurs observateurs). Un couple, peut-être nicheur, a été vu régulièrement, dès le début de mars, perché sur la structure du pont Madeleine-Parent de l'autoroute 30, celui qui traverse le canal de Beauharnois (plusieurs observateurs).

Harfang des neiges

Une femelle immature qui fréquentait depuis le 16 novembre les environs du croisement entre le chemin Sainte-Julie et de la montée Sainte-Julie à Sainte-Marthe était toujours présente le 12 mai (plusieurs observateurs). Le même jour (12 mai), un deuxième individu a été observé dans l'herbe en bordure de l'intersection des autoroutes 20 et 30 à Vaudreuil-Dorion (plusieurs observateurs).

Maubèche des champs

Trois individus ont été vus et entendus, en mai et juin, dans un pâturage près de la voie ferrée qui croise la montée Smellie à Godmanchester (plusieurs observateurs). Trois individus ont été vus régulièrement tout le mois de juin dans un champ situé en face du 1444 chemin Gore à Hinchinbrooke (plusieurs observateurs). Deux individus ont été observés le 2 juin en bordure du chemin de la 1ère Concession à Hinchinbrooke près du numéro civique 763 (plusieurs observateurs). Un dernier individu a été observé perché sur un piquet de clôture le 9 juin, toujours en bordure du chemin de la 1ère Concession mais cette fois-là près du numéro civique 340 (A.Q. et L.G.).

Coulicou à bec noir

Il a été signalé, à partir de la deuxième semaine de mai jusqu'à la fin de juillet, sur les chemins Biggar, Smellie, et Carr-Front à Godmanchester, sur les chemins Jamieson et Shearer à Elgin ainsi que sur les chemins Gowan et Demers à Hinchinbrooke (plusieurs observateurs). Un individu a été observé régulièrement en juin et juillet à l'entrée du marais du sentier de la digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs).

Engoulevent Bois-pourri

Toujours présent (dès le 1 mai) à la réserve écologique du Pin rigide à Saint-Pierre ainsi qu'aux environs de la carrière Meloche (Chemin Saint-Dominique) à LesCèdres (plusieurs observateurs). Il en est de même pour la montée Mercier à Saint-Chrysostome, le rang des Botreaux à Ormstown et le chemin de Planches à Huntingdon qui sont toujours d'excellents endroits pour l'observation de cette espèce (plusieurs observateurs).

Viréo à gorge jaune

Un individu a été observé le 9 mai perché dans un arbre en bordure du sentier de la digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (D.S. et R.L.). Un deuxième individu a été observé, du 30 mai au 10 juin, dans un boisé en bordure du 4e rang à Godmanchester, entre la montée Biggar et la montée Smellie (plusieurs observateurs).

Paruline à ailes dorées

En mai et juin, une quinzaine d'individus ont été observés sur le chemin Walsh à Saint-Anicet, sur le chemin Carr-Front et la montée Biggar à Godmanchester ainsi que sur les chemins Gore et Gowan à Hinchinbrooke (plusieurs observateurs). De ce nombre, les trois individus (deux mâles et une femelle) de la montée Biggar ont été les plus populaires auprès des observateurs et des photographes de la province.

Paruline à ailes bleues

Un mâle a été observé le 11 mai sur la montée Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs). L'oiseau n'a pas été revu par la suite.

Paruline de Brewster

Un individu de deuxième génération a été observé du 12 mai au 15 juin sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs). Un deuxième individu, un hybride très semblable à une paruline à ailes dorées pure mais avec des traces de jaune à l'abdomen, a été observé du 18 mai au 15 juin, toujours sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs). Cet individu montrait des signes d'introgression : il est le résultat du croisement d'un hybride de paruline à ailes dorées et de paruline à ailes bleues dont les descendants se sont reproduits exclusivement avec des parulines à ailes dorées. Un individu semblable, avec encore plus de jaune à l'abdomen, a été observé en mai sur le chemin Walsh à Saint-Anicet (P.B.).

Gobemoucheron Gris-bleu

Un individu a été observé le 29 avril à l'entrée du marais du sentier de la digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs). Un couple construisant un nid a été observé le 24 mai, toujours à l'entrée du marais du sentier de la digue aux Aigrettes (A.C.). Après avoir mené à terme une nichée de quatre jeunes, les oiseaux ont été vus sur le site pour la dernière fois, le 22 juin (plusieurs observateurs).

Dickcissel d'Amérique

Un mâle chanteur, très territorial, s'est tenu du 8 juin au 17 juillet sur les fils électriques bordant un champ situé au coin de la rue Clinton et de la route 202 à Franklin (plusieurs observateurs). L'oiseau pourchassait inlassablement tous les autres espèces d'oiseaux qui passaient trop près de son perchoir.

Guiraca bleu

Un mâle de première année s'est tenu du 23 au 29 juin dans un verger situé au coin de la rue Clinton et de la route 202 à Franklin (plusieurs observateurs). L'oiseau semble avoir été attiré par le chant incessant d'un dickcissel d'Amérique qui fréquentait le même secteur à ce moment-là, une espèce qui se retrouve dans le même genre d'habitat que le guiraca bleu dans le sud-ouest des États-Unis. Le guiraca bleu aurait été probablement chassé définitivement du site par ce même dickcissel d'Amérique qui démontrait un comportement très territorial.

Bruant des plaines

Un mâle chanteur a été entendu et vu du 24 mai au 15 juin devant le 414 montée Smellie à Godmanchester (A.C. et P.L.). Un autre individu a été vu et entendu le 29 mai au coin des rues Prince et Baird dans la ville de Huntingdon (S.C. et A.Q.). Un troisième individu a été observé du 2 au 22 juin, perché dans les jeunes pins situés en bordure du chemin Leahy à Saint-Anicet, pas très loin du Centre d'interprétation du site archéologique Droulers-Tsiionhiakwhata (plusieurs observateurs). Un dernier individu a été observé le 20 juillet, chantant au sommet d'une épinette située derrière le 577 James-Fisher à Hemmingford (P.B.).

Mésange bicolore

Cinq mâles chanteurs, probablement nicheurs, ont été observés régulièrement du début de mars au début de juillet, près de mangeoires de la rue Brosseau, de la rue de Montigny et de l'avenue des Villas à Saint-Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs).

Barge marbrée

Une barge marbrée juvénile a été observée du 14 au 17 août parmi un groupe de limicoles en bordure de la rivière Châteauguay près du barrage de Sainte-Martine (Plusieurs observateurs).

Bécasseau à échasses

Cinq individus ont été observés le 23 juillet à la carrière Meloche (M.D.). Cette carrière est située au bout de la montée Saint-Dominique à LesCèdres. Un autre individu a été observé au même endroit le 14 août (M.D.). Un dernier bécasseau à échasses a été observé du 14 au 17 août parmi un groupe de limicoles, en bordure de la rivière Châteauguay près du barrage de Sainte-Martine (Plusieurs observateurs).

Vous pouvez contacter Denis Gervais au 371-6514 ou Alain Quenneville au (514) 425-5499 pour signaler vos observations.

Observateurs :

P.B.	Pierre Bannon	L.G.	Luc Goneau
J.C..	Jasmine Cantara	P.L.	Patrick Laniel
S.C.	Sébastien Castagnier	R.L.	Réal Leduc
A.C.	André Cyr	A.Q.	Alain Quenneville
M.D.	Mark Dennis	D.S.	Denise Simon
R.F.	Régis Fortin		



Les numéros de téléphone ou adresses à retenir

Activités :	Denis Gervais	(450) 371-6514
Trésorerie :	Denis Lefebvre	administration@sofaso.com
Espèces menacées :	Alain Quenneville	(514) 425-5499
Statistiques ÉPOQ :	Régis Fortin	(450) 371-4927

S.O.S Braconnage : 1-800-463-2191

Comment faire pour signaler une observation ?

Vous avez observé une espèce que vous croyez digne de mention? N'hésitez pas! Contactez Denis Gervais au (450) 371-6514.

Le Regroupement QuébecOiseaux a signé une entente avec le laboratoire d'ornithologie de l'université Cornell et Études d'oiseaux Canada afin de mettre en place un portail eBird pour le Québec. Ce portail permet aux ornithologues du Québec de contribuer au suivi des populations d'oiseaux, tout en offrant des outils interactifs de visualisation des données (cartes de répartition, histogrammes de présence, etc.).

Ce portail est maintenant le guichet principal pour l'enregistrement des observations d'oiseaux du Québec. Du même coup, certaines observations pourront être redirigées automatiquement vers la Page des oiseaux rares et d'autres programmes de suivi des populations d'oiseaux, comme SOS-POP.

Le portail eBird Québec est en ligne depuis le 1er mars 2014 à l'adresse www.ebird-qc.ca.

La S.O.F.A. vous encourage à utiliser ledit portail, car le feuillet ÉPOQ ne sera plus inclus lors de l'envoi de votre nouvelle carte de membre.

Si vous avez des questions sur le fonctionnement d'eBird Québec, nous vous invitons à les poser à l'adresse http://bit.ly/1fXvz28.

Compte rendu des activités



Samedi 26 avril 2014

Marais de Saint-Timothée

Six participants ont observé 33 espèces.

Vu le temps incertain annoncé, le groupe a décidé de tenter notre chance au marais de Saint-Timothée au lieu de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee.

La décision était bonne, car la pluie s'est mise à tomber vers 9h30.

Samedi 3 mai 2014

Sainte Marthe

Huit participants ont observé 33 espèces.

Les oiseaux chanteurs n'étaient pas au rendez-vous; alors, d'un commun accord et suite à la suggestion d'une participante, nous nous sommes dirigés à l'Auberge des Gallants, où nous avons pu enfin observer plusieurs espèces.

La pluie a cessé vers 9h, et le petit étang a grandement aidé notre cause.

Compte rendu des activités



Mercredi 7 mai 2014

Marais de Saint-Timothée

Sept participants incluant le guide ont observé 26 espèces.

Samedi 10 mai 2014

South Lancaster--Cooper Marsh C.A., Stormont, Dundas and Glengarry

3 participants incluant le guide ont observé 43 espèces

À notre arrivée, le ciel était nuageux, voire menaçant,
mais le ciel s'est éclairci peu à peu,
laissant la place à un ciel ensoleillé.

Fin de semaine du 10 mai 2014

Grand défi QuébecOiseaux

Compte rendu des activités



Mercredi 14 mai 2014

Île Dondaine

Cinq participants ont observé 31 espèces
Un groupe d'une trentaine de parulines à croupion jaune
a permis de pratiquer le repérage de parulines dans les arbres.
Un bihoreau gris s'est laissé admirer à la fin de la sortie.

Dimanche 18 mai 2014

Ingleside, Ontario

Onze observateurs enthousiastes ont parcouru les sentiers du refuge. La journée a débuté sous un soleil radieux et s'est terminé sur la même note. Un total de 62 espèces ont été observées ou entendues. Parmi celles-ci, il y a eu la paruline des pins, le piranga écarlate et le cardinal à poitrine rose. Nous avons entendu un tohi à flancs roux mais il est demeuré invisible. Au chapitre des parulines, 10 espèces furent observées dont la paruline à gorge noire et la paruline obscure.

Avons-nous vu un porc-épic?

Compte rendu des activités



Mercredi 21 mai 2014

Saint-Étienne de Beauharnois

Les 7 participants ont observé un bruant vespéral parmi
les 26 espèces vues ou entendues.
Il était demeuré invisible malgré son chant l'an dernier.
2 oies des neiges et 2 grandes aigrettes
ont été observées dans le bassin aménagé par Canards Illimités.
Nous avons entrevu un faucon émerillon passant
au dessus du bassin.
Contrairement à l'an dernier, aucune alouette hausse-col
n'a été observée.

Compte rendu des activités



Samedi 31 mai 2014

Saint-Anicet

Par une journée chaude (25°C), 9 participants (8+ le guide) ont observé 62 espèces.

Généralement, lors de cette dernière sortie de la saison, nous en profitons pour faire une tournée du secteur de Saint-Anicet à la recherche des spécialités aviaires de la région. C'est une sortie sans itinéraire préétabli, qui varie d'une année à l'autre selon les goûts des participants et la présence d'espèces rares signalées dans la région visitée. Cette fois-ci, nous avons choisi de commencer la sortie par le chemin Biggar, où la paruline à ailes dorées et la paruline à ailes bleues avaient été observées quelques jours auparavant. Malheureusement, nous n'avons pas vu la paruline à ailes bleues. Par contre, la paruline à ailes dorées s'est laissée observer facilement, ainsi que d'autres espèces toutes aussi intéressantes, comme le piranga écarlate, le moqueur roux et le tohi à flancs roux. Par la suite, nous avons fait un arrêt sur la montée Smellie, ce qui nous a permis d'y observer la maubèche des champs, le goglu des prés, la sturnelle des prés et d'autres espèces communes. Pour finir, nous avons fait un arrêt sur le chemin Carr-Front, ce qui nous a permis de trouver un couple de dindons sauvage et de mieux observer le goglu des prés.

Vendredi 13 juin 2014

La sortie conjointe avec le club ornithologique de Vaudreuil Soulanges a été annulée à cause de la mauvaise température.

Deux conférences à l'automne

Mercredi le 29 octobre 2014 au Club nautique de Valleyfield,
410 rue Victoria à Salaberry de Valleyfield à 19 :30 heures
Conférencier : Jean-François Giroux
Durée : 2 heures

Le suivi des oiseaux à l'échelle locale, régionale et continentale

Les ornithologues ont toujours été fascinés par les déplacements des oiseaux et ont développé différentes techniques de marquage pour comprendre où, quand et pourquoi les oiseaux se déplacent. Durant cette présentation, nous allons nous concentrer sur trois espèces étudiées par notre groupe : les Bernaches du Canada, les Goélands à bec cerclé et les Eiders à duvet. Nous avons utilisé différentes techniques de marquage incluant des nouveaux consignateurs miniatures de localisations GPS qui permettent de suivre les mouvements locaux, régionaux et continentaux de ces espèces durant différentes phases de leur cycle annuel. Nous allons comparer les avantages et désavantages de ces techniques et démontrer comment les données recueillies peuvent être utilisées pour étudier l'écologie et le comportement des oiseaux. Certaines techniques dépendent essentiellement d'étudiants et de techniciens impliqués dans les projets de recherche mais d'autres peuvent grandement bénéficier de la participation du public, plus particulièrement de la collaboration des observateurs d'oiseaux et des chasseurs. La Science citoyenne s'est considérablement développée au cours des dernières années grâce en autres à l'utilisation de l'Internet. Vous apprendrez comment vous pouvez participer à ces programmes de recherche.

Professeur titulaire au Département des sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Jean-François Giroux enseigne et supervise des projets de recherche en écologie et en aménagement de la faune, particulièrement sur les oiseaux migrateurs. Il occupe aussi une poste d'administrateur de la Société Duvetnor, un organisme à but non lucratif voué à la conservation et à l'éducation dans les îles du Bas St- Laurent.

Mercredi le 26 novembre 2014 au Club nautique de Valleyfield
410 rue Victoria à Salaberry de Valleyfield à 19 :30 heures
Conférencière : Michèle Amyot
Durée : 2 heures

Archipel de Mingan

Qui peut vraiment rester indifférent devant un Macareux-moine? La conférencière est une passionnée de photographie animalière et une ornithologue curieuse et patiente. Elle vous propose un voyage animé dans un petit paradis pour les yeux. Photos, récits et anecdotes dans la région des Iles-de-Mingan vous feront voyager avec les alcidés, laridés, canards de mer et autres. De plus, le comportement des divers oiseaux, dont certains nichent sur place, ainsi que des conseils pour avoir les meilleures chances de les observer, où les trouver et plein de petits trucs seront au programme pour vous permettre de visiter cet endroit, virtuellement, ou dans le futur.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

AUTOMNE 2014

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES OU DE FROID INTENSE

Dimanche 19 octobre 2014 Île Dondaine	**Samedi 8 novembre 2014 Pont St-Louis de Gonzague**
Cette île est un excellent site en période de migration : on y trouve de nombreux bruants et quelques fois des bécasseaux en cette période de l'année. Au cours des années, environ 170 espèces d'oiseaux y ont été dénombrées. On y voit quelquefois le Balbuzard pêcheur et de la sauvagine vous y attend. Seront-t-ils au rendez-vous? **Lieu du rendez-vous** : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 8 heures **Durée de l'activité** : 3 heures **Guide :** Denis Gervais (450) 371-6514	Le mois de novembre est celui des migrations. L'Oie des neiges et la Bernache du Canada forment de grands rassemblements avant leur départ. Le pont St-Louis de Gonzague est propice à ces rassemblements. Nous pourrons possiblement y observer quelques espèces de canards en groupes de plusieurs individus **Lieu du rendez-vous** : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 8 heures **Durée de l'activité** : 4 heures **Guide :** Alain Hogue (450) 373-2890

Dimanche 7 décembre 2014 La tournée de l'Avicourse	**Dimanche 21 décembre 2014 Décompte de Noël d'Audubon**
Piste cyclable/Digue Hydro-Québec (Coteau-du-Lac) Pont de St-Louis-de-Gonzague, Marais de St-Timothée Digue/barrage Smith à Beauharnois Marais de St-Étienne-de-Beauharnois Hungry Bay Espèces espérées : Des canards dont l'harelde kakawi et les macreuses, la mésange bicolore et des rapaces. Les participants peuvent quitter à tout moment. **Lieu du rendez-vous** : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 8 heures **Durée de l'activité** : 4 heures et plus **Guide :** Denis Gervais (450) 371-6514	Un secteur du territoire de la SOFA sera ratissé afin de faire un décompte qui nous renseignera sur le nombre d'espèces et d'individus présents à cette période de l'année. Selon le nombre de participants présents, l'activité durera de quatre à huit heures. Prévoir des vêtements chauds. **Confirmez votre présence auprès du responsable afin de planifier les équipes.** **Lieu du rendez-vous** : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 6 :45 heures **Durée de l'activité** : 4 à 8 heures **Responsable :** Denis Gervais (450) 371-6514

Résultats des excursions 2014

Plongeon huard		**Perdrix grise**	x	Pioui de l'Est		**Paruline obscure**	x
Grand cormoran		**Gélinotte huppée**	x	**Moucherolle des aulnes**	x	**Paruline à ailes dorées**	x
Grèbe à bec bigarré	x	**Dindon sauvage**	x	Moucherolle des saules		Paruline à collier	
Grèbe jougris		Râle jaune		**Moucherolle tchébec**	x	**Paruline jaune**	x
Cormoran à aigrettes	x	Râle de Virginie		**Moucherolle phébi**	x	**Paruline à flancs marron**	x
Grue du Canada		**Marouette de Caroline**	x	Moucherolle à coté olive		Paruline à tête cendrée	
Butor d'Amérique	x	**Gallinule poule d'eau**	x	**Tyran huppé**	x	Paruline bleue	
Petit Blongios		Foulque d'Amérique		**Tyran tritri**	x	**Paruline à croupion jaune**	x
Grand Héron	x			Pie-grièche grise		**Paruline à gorge noire**	x
Grande Aigrette	x	Pluvier semipalmé				Paruline à gorge orangée	
Héron vert	x	**Pluvier kildir**	x	Viréo à gorge jaune		Paruline à la poitrine baie	
Bihoreau gris	x	Pluvier bronzé		Viréo à tête bleue		Paruline des pins	
Plongeon catmaran		Grand Chevalier		**Viréo mélodieux**	x	Paruline rayée	
Urubu à tête rouge	x	**Petit Chevalier**	x	**Viréo aux yeux rouges**	x	**Paruline noir et blanc**	x
Oie rieuse		**Chevalier solitaire**	x	Viréo de Philadelphie		**Paruline flamboyante**	x
Oie des neiges	x	Chevalier grivelé		**Geai bleu**	x	Paruline couronnée	
Oie de Ross						Paruline verdâtre	
Bernache du Canada	x	**Maubèche des champs**	x	**Corneille d'Amérique**	x	Paruline des ruisseaux	
Bernache de Hutchins		Bécasseau semipalmé		**Grand Corbeau**	x	Paruline de Brewster	
Cygne siffleur		Bécasseau minuscule				**Paruline masquée**	x
Canard branchu		Bécasseau variable		**Alouette hausse-col**	x	Paruline à couronne rousse	
Canard chipeau	x	Bécasseau à poitrine cendrée		Pipit d'Amérique		Paruline à ailes dorées	
Canard d'Amérique	x	**Bécassine de Wilson**	x	Hirondelle noire		Paruline à calotte noire	
Canard noir	x	**Bécassine des marais**	x	**Hirondelle bicolore**	x	**Tohi à flancs roux**	x
				Hirondelle à ailes			
Canard colvert	x	Bécasse d'Amérique		hérissées		**Piranga écarlate**	x
Sarcelle d'hiver	x	Phalarope à bec étroit				**Bruant hudsonien**	x
Sarcelle à ailes bleues		Mouette tridactyle		Hirondelle de rivage		**Bruant familier**	x
Canard souchet	x	Mouette de Bonaparte		Hirondelle à front blanc		**Bruant des champs**	x
Canard pilet		Mouette de Sabine		**Hirondelle rustique**	x	**Bruant fauve**	x
		Goéland argenté	x				
Fuligule à tête rouge	x	**Goéland marin**	x	**Mésange à tête noire**	x	**Bruant des prés**	x
Fuligule à collier	x	**Goéland à bec cerclé**	x	**Mésange bicolore**	x	**Bruant chanteur**	x
Fuligule milouinan	x	Sterne caspienne				**Bruant des marais**	x
Petit Fuligule		**Sterne pierregarin**	x	Sitelle à poitrine rousse		**Bruant à gorge blanche**	x
Arlequin plongeur		Guifette noire		**Sittelle à poitrine blanche**	x	**Bruant à couronne blanche**	x
Macreuse à front blanc						**Bruant vespéral**	x
Macreuse brune		**Pigeon biset**	x	**Grimpereau brun**	x	**Junco ardoisé**	x
Macreuse noire		**Tourterelle triste**	x			**Plectrophane des neiges**	x
Harelde kakawi	x			Troglodyte de Caroline		**Cardinal rouge**	x
Petit Garrot	x	Coulicou à bec noir		Troglodyte familier		**Cardinal à poitrine rose**	x
Garrot à œil d'or	x	Petit duc maculé		Troglodyte mignon		Passerin indigo	
Garrot d'Islande		Hibou moyen-duc		Troglodyte à bec court			
Harle couronné	x	Grand-duc d'Amérique		Troglodyte des marais		**Goglu des prés**	x
Grand Harle	x	**Harfang des neiges**	x	Troglodyte des forêts		**Carouge à épaulettes**	x
				Roitelet à couronne			
Harle huppé		Chouette rayée		**dorée**	x	**Sturnelle des prés**	x
Érismature rousse		Chouette Lapone		**Roitelet à couronne rubis**	x	**Quiscale rouilleux**	x
Balbuzard pêcheur		Engoulevent bois-pourri		**Merle d'Amérique**	x	**Quiscale bronzé**	x
Pygargue à tête							
blanche	x			Merle bleu de l'est		**Vacher à tête brune**	x
Busard Saint-Martin	x	Martinet ramoneur		**Grive fauve**	x	**Oriole de Baltimore**	x
Épervier brun		Colibri à gorge rubis		Grive solitaire			
Épervier de Cooper				Grive des bois		Durbec des sapins	
Crécelle d'Amérique		**Martin-pêcheur d'Amérique**	x	Grive à dos olive		Roselin pourpré	
Buse à épaulettes	x	Pic à ventre roux		**Moqueur chat**	x	Roselin familier	
Petite Buse	x	Pic Tridactyle		**Moqueur roux**	x	Bec-croisé bifascié	
Buse à queue rousse	x	**Pic maculé**	x	Moqueur polyglotte		Gros bec errant	
Buse pattue		**Pic mineur**	x	**Étourneau sansonnet**	x	**Chardonneret jaune**	x
Faucon Émerillon	x	**Pic chevelu**	x	Jaseur Boréal		Tarin des pins	
Faucon Pèlerin	x	**Pic flamboyant**	x	**Jaseur d'Amérique**	x	Sizerin flammé	
Crécerelle							
d'Amérique	x	**Grand Pic**	x	Pie-grièche grise		**Moineau domestique**	x
TOTAL : **115 espèces**							



Règlements et suggestions pour les activités

L'équipement

En plus de votre guide d'identification et de vos jumelles, assurez-vous de porter des vêtements et des chaussures de circonstance et de prévoir de la nourriture et des breuvages en fonction de la durée de l'activité.

Le co-voiturage

Nous encourageons vivement le co-voiturage lors des excursions. Il est de mise que chaque participant qui profitera de la voiture d'un autre lui verse une contribution de 0,05 $ du kilomètre.

Les invités

Si vous avez un ami ou un parent qui s'intéresse aux oiseaux, vous pouvez l'inviter à participer à une activité sans obligation de sa part. Les frais sont de 5 $.

Les enfants

L'observation des oiseaux est un magnifique loisir pour les enfants. Cependant, pour des raisons de sécurité, les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés d'un adulte.

Votre guide

Votre guide est là pour animer et diriger le groupe tout au long de la journée. N'hésitez pas à le questionner et à lui faire part de vos commentaires et suggestions. N'oubliez pas que votre guide est un membre qui a eu la gentillesse d'animer bénévolement votre excursion. Il est responsable des allées et venues du groupe et de l'application des règles d'éthique.

Vous aimez les oiseaux ?

Abonnez-vous au magazine QuébecOiseaux !

Une revue sans but lucratif publiée par le Regroupement QuébecOiseaux

<u>Être abonné c'est</u> :

- **découvrir et partager la passion des oiseaux**
- **posséder un outil pédagogique et des références de qualité**
- **recevoir à domicile une revue exceptionnelle à un prix abordable**
- **aider à faire connaître et protéger les oiseaux du Québec.**



Je veux m'abonner au magazine QuébecOiseaux

☐ 22,95 $ - 4 numéros (1 an) ☐ Nouvel abonnement

☐ 42,95 $ - 8 numéros (2 ans) ☐ Renouvellement

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Code Postal : _____

Payable à : Regroupement QuébecOiseaux

□ Chèque □ Mandat poste □ MasterCard □ Visa

No de carte : _____

Date d'expiration : _____

Signature : _____

Visitez notre site internet et abonnez-vous en ligne : www.quebecoiseaux.org