Le Picocheur

Bulletin de la Société d'observation de la faune ailée du Sud-Ouest
C.P. 1231, Succursale A, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6S1
Août 2016 volume XXVI numéro 3

Visitez notre site internet: au www.sofaso.com

MOT DU PRÉSIDENT

Nous débutons la vingt-sixième année de la parution de notre journal interne. En juillet 1991, il avait pour titre « À travers les jumelles »; maintenant, c'est « Le Picocheur ».

Comme d'habitude, nous vous avons planifié des activités pour l'automne. Il y aura deux conférences: une qui a pour titre « Houston à Tucson » (cela veut tout dire) et une sur « Les hérons» par Régis Fortin.

La Réserve nationale de faune du lac Saint-François, à Dundee, a connu un achalandage monstre, dû à la présence des nids de grues du Canada, de pygargues à tête blanche, mais aussi d'un nid de buse à épaulettes, une première pour la réserve. Cependant, le gobemoucheron gris-bleu ne semble pas avoir niché sur le sentier de la digue aux aigrettes.

Éditorial

La chasse aux tourterelles aura lieu… sans commentaire…ou plutôt si …bon appétit.

Mot de la fin

On vous attend nombreux aux activités de l'automne et n'oubliez pas le décompte de Noël le 18 décembre…

Denis Gervais
Président

Photo de la page couverture :
Bernache cravant
réalisée par Alain Quenneville

SOMMAIRE

Avril/Mai/Juin/Juillet 2016

3 Portrait: Bernache cravant
Alain Quenneville

6 Faits saillants hiver 2015-2016
Alain Quenneville

11 Compte-rendu des activités

16 Calendrier des activités

18 Résultats excursions 2016

Comité ZIP du Haut Saint-Laurent

Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent a établi récemment un partenariat avec le Comité Consultatif Jeunesse pour un projet qui a été lancé récemment à l'échelle nationale. Le Défi des Grands Bassins Hydrographiques (DGBH) est un projet financé par Patrimoine canadien et réalisé par Waterlution, qui est en branle depuis le 5 juillet dernier. Conçu par des jeunes pour des jeunes, le DGBH a comme objectif de montrer à quel point l'identité des Canadiens est liée aux bassins hydrographiques — du savoir traditionnel autochtone aux pratiques occidentales. Une série de défis, de webinaires et d'actions communautaires directes attendent les jeunes de moins de 30 ans des communautés canadiennes pour découvrir l'histoire de nos grands bassins hydrographiques.

Ces défis commencent en ligne et entraînent des actions communautaires directes, où les participants mettent au point des réalisations créatives afin de faire participer leur communauté. Vous trouverez tous les détails ici : https://waterlution.org/dgbh16/

L'inscription se termine le 14 septembre , à 20 h HNE

Bernache cravant

Ce texte est en grande partie tiré du site internet: http://www.oiseaux-birds.com/

Description

Facilement identifiable, la Bernache cravant ressemble à une petite oie à dominante sombre. En effet, la tête, le cou, la poitrine, la queue, le bec et les pattes sont noirs tandis que le dessus du corps est gris brun avec des bordures claires. Le dessous du corps et les ailes sont gris brunâtre. Les sus et les sous-caudales sont blanches. Les iris sont brun foncé.

Cet oiseau mesure entre 51 et 66 cm de longueur pour une envergure de 105 à 117 cm et une masse de 1,2 à 1,7 kg.

L'adulte se distingue du jeune par la tache blanche qu'il arbore de chaque côté du cou, formant une cravate d'où est tiré le nom spécifique français.

Le juvénile ressemble aux adultes avec les parties noires plus brunes et plus ternes. La tache blanche du cou est absente. Les flancs sont plus clairs avec des liserés pâles plus nets formant des barres fines, alors que les plumes des parties supérieures présentent des bordures blanches.

Habitat

La bernache cravant est présente dans la toundra de l'ensemble de la zone arctique américaine, européenne et russe. Elle recherche les zones humides et salées et fréquente les vasières du front de mer, où elle recherche sa nourriture. Elle fréquente principalement des vasières dans des abris naturels, le plus souvent en bandes qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'individus. Elle est très rare sur les eaux douces. Elle hiverne dans la partie sud de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie. Elle est en augmentation constante dans ses quartiers d'hiver. La zone de nidification de cette espèce s'étend dans la toundra de tout l'hémisphère nord.

La Bernache cravant se reproduit dans la toundra Arctique, plus loin au nord que n'importe quelle autre espèce d'oie. Elle nidifie en général près des côtes, au bord des lagunes ou sur des îles.

Alimentation

Le régime est exclusivement végétarien : algues, mousses, lichens en été ; zostères, salicornes, algues vertes, semis de céréales, herbacées en hiver. Sur les lieux d'hivernage, la bernache cravant est un herbivore strict, se nourrissant souvent exclusivement d'une seule plante aquatique du littoral marin: la zostère marine. Cette dépendance fut à l'origine de sa raréfaction dans le second tiers du 20ème siècle, à la suite de la forte diminution des surfaces d'herbiers à zostère dans les années 1930. Mais avec l'augmentation des effectifs des bernaches dans les années 1970, on a observé des modifications de leur comportement alimentaire. Ainsi, au cours de l'hiver et selon les secteurs occupés, les bernaches vont consommer préférentiellement la zostère marine avant de se reporter sur une ressource alternative comme la laitue de mer ou encore les herbes de prés salés. Depuis quelques dizaines d'années, les bernaches ont élargi la gamme de leurs ressources alimentaires en stationnant de façon plus prononcée sur des prairies ou encore des champs de céréales d'hiver. Ceci pourrait expliquer qu'alors que de nombreuses autres espèces d'oiseaux marins ou des zones humides régressent, cette espèce soit localement en forte augmentation (sur la côte ouest de l'Amérique du nord notamment).

Reproduction

Sous les hautes latitudes où se reproduisent ces oies, la bonne saison pour accomplir un cycle complet de reproduction est

généralement trop courte. La formation du couple ainsi que les parades nuptiales ont donc souvent lieu sur les aires d'hivernage ou pendant la migration vers les zones de reproduction.

La Bernache cravant de l'Atlantique niche dans des colonies peu denses sur des îles de l'est de l'Arctique. Les principales colonies de reproduction sont situées dans le bassin Foxe, à l'ouest de l'île de Baffin. La saison de reproduction est très courte pour la Bernache cravant de l'Atlantique. La neige des lieux de reproduction fond à la mi-juin et l'hiver revient au début de septembre. Au cours d'une année moyenne, cela laisse juste assez de temps pour pondre les oeufs et les couver, puis élever les oisons jusqu'à ce qu'ils puissent voler. Les années où la neige fond tardivement, les femelles réabsorbent les oeufs pour conserver les éléments nutritifs que ferait perdre une tentative de nidification qui échouerait. La température dans leurs sites de reproduction de l'Extrême-Arctique fait parfois échouer la production de la Bernache cravant de l'Atlantique.

La Bernache cravant se reproduit une fois par an, pendant la meilleure période climatique. Les liens du couple durent toute la vie. La saison de reproduction commence en juin et dure environ trois mois. La Bernache cravant nidifie en couples solitaires ou en colonies lâches.

Lorsqu'elles nidifient en colonies, ce comportement a pour fonction essentielle de défendre et de protéger les oies contre les prédateurs tels qu'ours, renards, goélands et labbes qui prennent les œufs et les poussins. Les parades entre les deux partenaires comprennent des postures rituelles avant l'accouplement, qui a lieu en général dans l'eau. Elles se reproduisent sur la toundra et souvent près de l'eau. Le nid est une dépression peu profonde sur le sol, tapissé de matériaux fins tels que mousses, herbes et duvet.

La femelle dépose généralement 3 à 5 œufs à la mi-juin, qu'elle incube pendant 24 à 26 jours, tandis que le mâle reste près du nid. Les poussins sont couverts de duvet grisâtre sur le dessus et blanchâtre dessous. Ils abandonnent le nid très vite après la naissance, et sont emplumés au bout de six semaines pendant lesquelles les adultes muent. Ils restent en groupes familiaux jusqu'à la saison de reproduction suivante, et migrent ensemble. Les jeunes deviennent matures sexuellement vers l'âge de deux et trois ans.

Répartition

La Bernache cravant a une répartition circumpolaire, ce qui veut dire qu'on la retrouve autant en Sibérie, en Alaska, au Canada qu'au Groenland. Selon les populations, la Bernache cravant hiverne en Europe, dans le sud des États-Unis, dans la Nouvelle-Zemble en Russie ou dans le sud de l'Asie.

Menaces

Après de nombreux déclins, les populations de la Bernache cravant sont aujourd'hui relativement stables. Il existe d'importantes fluctuations d'une année à l'autre selon les saisons de reproduction, qui dépendent des conditions atmosphériques, des ressources de nourriture, des dérangements et de la chasse. Cependant, cette espèce est actuellement considérée comme non menacée. Les populations mondiales sont estimées à près de 240.000 individus et, compte tenu de leur vaste aire de distribution, l'espèce n'est donc pas classée en danger.

Où et quand observer la Bernache cravant sur le territoire de la SOFA

Dans la région, la Bernache cravant s'observe généralement en migration au printemps et en automne. On peut l'observer principalement le long du canal de Beauharnois souvent en mai, mais surtout en octobre et novembre. Le meilleur endroit pour la voir est situé aux environs de l'embouchure du canal, à Hungry Bay, du côté de Saint-Stanislas-de-Kostka.

AIDEZ-NOUS À RECRUTER DE NOUVEAUX MEMBRES

Vous connaissez un ami, un parent qui cherche une activité de plein air à un prix abordable? Pourquoi ne pas lui parler de la SOFA?

Seul ou en famille, la SOFA lui propose de partir à la découverte du merveilleux monde des oiseaux en compagnie de guides qualifiés. Se joindre à un club d'ornithologie lui permettra également de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts et d'échanger sur une foule de sujets reliés à la nature, la faune et la flore.

COUPON D'ABONNEMENT À LA SOFA

NOM : _____ TÉLÉPHONE : (___) _____

ADRESSE : _____ CODE POSTAL : _____

VILLE : _____ COURRIEL : _____

NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE : _____ (Coût annuel de 25 $)

Cochez s'il y a lieu: ☐ « Je refuse que mes coordonnées soient divulguées à d'autres organismes. »

La contribution annuelle pour adhérer à la SOFA est de 25 $. Votre adhésion est familiale, c'est à dire qu'elle s'applique à votre conjoint (e) ainsi qu'à vos enfants résidant à la même adresse.

Veuillez nous faire parvenir cette fiche d'adhésion ainsi que votre chèque à l'adresse suivante :

SOFA, C.P. 1231, SUCC. A
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC) J6S 6S1

Visitez notre site internet: au www.sofaso.com

Les faits saillants Printemps-début été 2016

Le temps froid de la fin du mois d'avril s'est poursuivi jusqu'à la mi-juin et, malgré quelques journées chaudes, la température moyenne est demeurée basse avec des moyennes jusqu'à 10°C sous la normale saisonnière. Le mercure a par la suite fait une remontée fulgurante. En effet, dès la fin du mois de juin, la province a vu deux fois plus de journées de 30 degrés et plus que la normale. Ce temps caniculaire s'est maintenu presque tout le mois de juillet et semble vouloir se maintenir encore pour une bonne partie du mois d'août.

Bernache cravant

17 individus ont été observés le 12 mai nageant sur le fleuve Saint-Laurent à la hauteur du quai de Les Côteaux. 36 individus ont été vus au même endroit le 19 mai et 70 autres individus le 27 mai (J.C. et C.C.).

Bruant des plaines

Deux mâles chanteurs ont été vus et entendus les 26 et 27 mai sur le chemin des Planches à Huntingdon, entre les chemins Teafield et Ridge (L.G. T.G. et A.Q). Au moins un individu a été présent au même endroit jusqu'au 12 juillet (plusieurs observateurs).

Bruant sauterelle

Un mâle chanteur a été vu et entendu du 23 mai au 4 juin en bordure du chemin Jamieson à Elgin (plusieurs observateurs)

Coulicou à bec jaune

Un mâle chanteur a été entendu le 23 mai en bordure du chemin Jamieson à Elgin (C.G.). Un deuxième mâle chanteur a été entendu du 24 mai au 20 juin sur la montée Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs). L'oiseau n'a été vu brièvement que le 1er juin (R.F. et L.P.). Un dernier mâle chanteur a été entendu le 12 juin en bordure de la montée Gordon à Dundee (Plusieurs observateurs).

Coulicou à bec noir

Il a été signalé, à partir de la deuxième semaine de mai jusqu'à la fin de juillet, sur les chemins Biggar, Smellie, Seigneurial et Carr-Front à Godmanchester, sur le chemin Jamieson à Elgin ainsi que sur les chemins Gowan et Demers à Hinchinbrooke (plusieurs observateurs). Un individu a été observé régulièrement en juin et juillet dans les aménagements de Canards Illimités du marais de Saint-Timothée (plusieurs observateurs).

Cygne siffleur

Un individu a été observé dès le 5 juin sur la rivière Saint-Charles à Salaberry-de-Valleyfield, à la hauteur du boulevard Mgr-Langlois (route 201). L'oiseau était surtout visible de la rue Léger (plusieurs observateurs). L'oiseau était toujours présent au même endroit à la fin de juillet au moment d'écrire ces lignes.

Engoulevent bois-pourri

Toujours présent (dès le 1 mai) à la réserve écologique du Pin rigide à Saint-Pierre, ainsi qu'aux environs de la carrière Meloche (Chemin Saint-Dominique) à Les Cèdres (plusieurs observateurs). Il en est de même pour la montée Mercier à Saint-

Chrysostome, le rang des Botreaux à Ormstown et le chemin des Planches à Huntingdon, qui sont toujours d'excellents endroits pour l'observation de cette espèce (plusieurs observateurs).

Faucon pèlerin

Deux couples nicheurs ont été observés, de mars à juillet, un sur le pont de Saint-Louis-de-Gonzaque à Saint-Timothée et un autre sur le pont Larocque à Valleyfield (plusieurs observateurs). Un couple, peut-être nicheur, a été vu régulièrement, dès le début de mars, perché sur la structure du pont de l'autoroute 30, le pont Madeleine-Parent, celui qui traverse le canal de Beauharnois (plusieurs observateurs).

Gobemoucheron gris-bleu

Un individu, a été observé le 15 mai dans le boisé de l'Île Dondaine (R.L.). Cette île appartient à Côteau-du-Lac mais n'est accessible que par Salaberry-de-Valleyfield, via le secteur de Grande-Île. Un individu a été observé le 8 juin en bordure du stationnement des aménagements de Canards Illimités du marais de Saint-Timothée (P.L.). Un individu a été observé du 12 au 18 mai sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs). Un couple probablement nicheur a été observé, du 15 juin au 10 juillet, dans un boisé en bordure du 4e rang à Godmanchester, entre la montée Biggar et la montée Smellie (plusieurs observateurs).

Grande Aigrette

Elles ont été observées régulièrement, d'avril à juillet, à Sainte-Martine, au bout de la rue Mac-Donald à Maple-Grove, ainsi qu'aux marais de Saint-Timothée et de Saint-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs observateurs). Elles ont fait leur apparition dès le 9 avril, dans le marais du sentier de la digue aux aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee.

Grue du Canada

Cinq individus ont été vus régulièrement, dès le 17 mars, dans le marais du sentier de la digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs). Le 2 avril, deux des grues de la réserve ont été observées en parade nuptiale (plusieurs observateurs). Le 10 avril, un des individus a été observé sur un nid contenant deux œufs. Ce nid était situé de l'autre côté du canal, pratiquement en face de la cache la plus près du stationnement, sensiblement au même endroit où un nid avait été observé les quatre années précédentes. Le 13 mai, deux poussins ont été observés avec deux adultes près du nid. Par la suite, les grues ont été vues à plusieurs reprises dans la partie plus marécageuse du site, à partir de la cache située dans la section boisée du sentier de la digue aux aigrettes (plusieurs observateurs). Le 3 juin, un des individus de ce même couple a été observé sur un nid contenant deux œufs; les poussins de la première couvée ont probablement été tués par des prédateurs. Ceux-ci sont assez nombreux sur le territoire de la réserve. Ce deuxième nid était situé de l'autre côté du canal, directement au bord de l'eau, toujours pratiquement en face de la cache la plus près du stationnement. Un des œufs a éclos le 30 juin. Le couple a été revu par la suite en juillet dans la partie marécageuse du site, mais pas le gruon, ce qui ne veut rien dire, étant donné la densité des hautes herbes du lieu en ce temps de l'année. En plus du couple ni-

cheur, un groupe de cinq individus a été vu régulièrement de mai à juillet, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs).

Hibou des marais

Un individu a été vu le 1er juin, en vol au dessus d'un champ en friche bordant l'autoroute 530, entre la sortie du boulevard Pie-XII et le pont Serge-Marcil (S.H.).

Maubèche des champs

Cinq individus (quatre adultes et un jeune) ont été vus et entendus, en mai et juin, dans un pâturage près de la voie ferrée qui croise la montée Smellie à Godmanchester (plusieurs observateurs). Trois autres individus ont été vus régulièrement tout le mois de juin dans un champ situé en face du 1444 chemin Gore à Hinchinbrooke (plusieurs observateurs). Deux derniers individus ont été observés, en juin et juillet, dans un champ situé au coin du chemin Carr-Front et de la montée Leblanc (plusieurs observateurs).

Mésange bicolore

Quatre mâles chanteurs, probablement nicheurs, ont été observés régulièrement du début de mars au début de juillet, près de mangeoires des rues Brosseau et de Montigny ainsi que de l'avenue des Villas à Saint-Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs).

Moqueur polyglotte

Un individu a été observé du 21 au 24 avril dans une haie de cèdres en bordure du 4314 route 132, près de la montée Cazaville à Saint-Anicet, secteur de Cazaville (plusieurs observateurs). Un deuxième individu a été observé du 16 au 18 juin dans le parc municipal de Les Côteaux (plusieurs observateurs).

Paruline à ailes bleues

Un mâle chanteur a été observé du 18 mai au 26 juin sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs). Le 20 mai, deux individus ont été observés au même endroit (plusieurs observateurs). Un troisième individu a été vu et entendu du 18 au 24 mai dans les arbustes en bordure du chemin Jamieson à Elgin (plusieurs observateurs). Un quatrième et dernier individu a été observé le 28 mai, (lors d'une sortie de la SOFA) dans un champ en friche situé en face du 1727 chemin Gore à Hinchinbrooke (plusieurs observateurs).

Paruline à ailes dorées

En mai et juin, deux mâles chanteurs ont été observés sur le chemin Biggar à Godmanchester (Plusieurs observateurs). Un de ces deux individus était toujours présent sur le site, le 3 juillet (A.Q. et L. D.). La seule femelle observée dans la région, lors de la saison de reproduction de l'espèce, l'a été le 1er juillet, sur la montée Biggar à Godmanchester (J.Co.).

Paruline azurée

Un mâle chanteur a été observé les 23 et 24 mai sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs).

Paruline de Brewster

Un individu de deuxième génération a été observé dès le 11 mai sur le chemin Biggar à Godmanchester. L'oiseau est demeuré sur le site jusqu'au 28 juin (plusieurs observateurs). Un individu de première génération a été vu du 20 mai au 26 juin, toujours sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs).

Pélican d'Amérique

Les 13 et 14 juin, jusqu'à 8 individus ont été observés sur le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de l'Île Dickerson, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs).

Petit Blongios

Ils ont été entendus et vus régulièrement (jusqu'à 5 individus), de la fin mai jusqu'à maintenant (début d'août), dans les aménagements de Canards Illimités du marais de Saint-Timothée (plusieurs observateurs).

Pic à tête rouge

Un individu a été observé dès le 8 juillet au coin du rang du 40 et de la route 138 près du site historique national de la bataille-de-la-Châteauguay (plusieurs observateurs). L'oiseau était toujours présent au même endroit à la fin de juillet, au moment d'écrire ces lignes.

Pygargue à tête blanche

Un adulte et un immature ont été observés régulièrement, en juin et juillet, tout le long du canal de Beauharnois, du barrage jusqu'à son embouchure (plusieurs observateurs). Un couple de pygargues à tête blanche a fréquenté encore cette année un gros nid, dans un arbre situé en bordure de la rivière Fraser à Dundee (plusieurs observateurs). Le nid est parfaitement visible de la route 132, à partir du pont de la rivière Fraser; ce pont est situé entre le chemin de la pointe Fraser et la montée Watson à Dundee. Le couple a produit un seul jeune et celui-ci a quitté le nid vers le 20 juin.

Sterne caspienne

Quelques individus, mais rarement plus de deux à la fois ont été observés en juin et juillet, au bout de la rue Mac-Donald à Maple-Grove, ainsi qu'aux environs du quai de Melocheville. Jusqu'à sept individus ont été observés régulièrement en juin et juillet, dans l'archipel d'Akwesasne, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs). Un adulte et un immature ont été observés régulièrement depuis le 16 juillet en bordure des étangs de la carrière Meloche (Plusieurs observateurs). Cette carrière est située au bout de la montée Saint-Dominique à Les Cèdres. Les oiseaux étaient toujours présents sur le site à la fin de juillet, au moment d'écrire ces lignes.

Troglodyte à bec court

Dès le début de juin, quatre adultes ont été observés régulièrement le long de la montée Gordon à Dundee (plusieurs observateurs). Les oiseaux étaient toujours présents sur le site à la fin de juillet, au moment d'écrire ces lignes.

Viréo à gorge jaune

Un individu (peut-être deux) ont été observés du 20 mai au 25 juin, dans un boisé de la montée Murchisson à Dundee (plusieurs observateurs). Un deuxième individu a été observé, du 18 mai au 10 juillet, dans un boisé en bordure du 4e rang à Godmanchester, entre la montée Biggar et la montée Smellie (plusieurs observateurs).

Vous pouvez contacter Denis Gervais au 371-6514 ou Alain Quenneville au (514) 425-5499 pour signaler vos observations

Observateurs :

A.Q.	Alain Quenneville
C.C.	Cécile Chevrier
C.G.	Chris Geraghty
J.C.	Jasmine Cantara
J.C.	Jean Côté
L.D.	Liette Desfossés
L.G.	Luc Goneau
L.P.	Lise Paquette
P.L.	Patrick Laniel
R.F.	Robert Faucher
R.L.	Rémi Laurin
S.H.	Steve Hamel
T.G.	Thierry Grandmont

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES OU ADRESSES À RETENIR		
Activités	Denis Gervais	(450) 371-6514
Trésorerie	Réal Leduc	administration@sofaso.com
Faits saillants	Alain Quenneville	(514) 425-5499
Révision eBird	Régis Fortin	(450) 601-5027
S.O.S. Braconnage		1-800-463-2191

Comment faire pour signaler une observation ?

Vous avez observé une espèce que vous croyez digne de mention? N'hésitez pas! Contactez Denis Gervais au (450) 371-6514.

Compte-rendu des activités

Samedi 7 mai 2016
Îles du Pont Mgr Langlois

Guide: Denis Gervais

Neuf(9) participants ont pu observer les 38 espèces suivantes:

Bernache du Canada, Canard colvert, Petit Garrot, Grand Harle, Cormoran à aigrettes, Grand Héron, Urubu à tête rouge, Chevalier grivelé, Goéland à bec cerclé, Goéland argenté, Sterne pierregarin, Pigeon biset, Tourterelle triste, Martin-pêcheur d'Amérique, Pic mineur, Pic chevelu, Pic flamboyant, Moucherolle phébi, Viréo mélodieux, Viréo de Philadelphie, Geai bleu, Corneille d'Amérique, Hirondelle bicolore, Hirondelle rustique, Mésange à tête noire, Sittelle à poitrine blanche, Merle d'Amérique, Étourneau sansonnet, Paruline jaune, Bruant familier, Bruant chanteur, Cardinal rouge, Carouge à épaulettes, Quiscale bronzé, Vacher à tête brune, Roselin familier, Chardonneret jaune, Moineau domestique.

Mercredi 11 mai 2016
Île Dondaine

Guide: Denis Gervais

Treize(13) participants ont observé les 35 espèces suivantes:

Cormoran à aigrettes, Bernache du Canada, Canard branchu, Canard colvert, Goéland à bec cerclé, Sterne pierregarin, PETIT-DUC MACULÉ, Pic maculé, Pic mineur, Pic chevelu, Pic flamboyant, Grand Pic, Moucherolle phébi, Viréo mélodieux, Geai bleu, Corneille d'Amérique, Hirondelle bicolore, Mésange à tête noire, Sittelle à poitrine blanche, Troglodte familier, Roitelet à couronne rubis, Merle d'Amérique, Étourneau sansonnet, Paruline jaune, Paruline à flancs marron, Paruline à croupion jaune, Paruline couronnée, Bruant chanteur, Cardinal rouge, PASSERIN INDIGO, Carouge à épaulettes, Quiscale bronzé, Vacher à tête brune, Oriole de Baltimore, Chardonneret jaune.

Compte-rendu des activités (suite)

Dimanche 15 mai 2016
Ingleside (Ontario)

Sortie annulée en raison des mauvaises conditions météo

Mercredi 18 mai 2016
Bois Robert (Beauharnois)

Guide: Denis Gervais

Par un temps magnifique, huit(8) personnes ont participé à cette excursion et 30 espèces ont été notées:

Canard branchu, Canard colvert, Goéland à bec cerclé, Colibri à gorge rubis, Pic maculé, Pic chevelu, Grand Pic, Tyran huppé, Hirondelle bicolore, Geai bleu, Corneille d'Amérique, Mésange à tête noire, Troglodyte familier, Grive solitaire, Merle d'Amérique, Moqueur chat, Étourneau sansonnet, Paruline jaune, Paruline à croupion jaune, Paruline flamboyante, Paruline couronnée, Paruline masquée, Piranga écarlate, Cardinal rouge, Cardinal à poitrine rose, Bruant chanteur, Carouge à épaulettes, Quiscale bronzé, Oriole de Baltimore, Chardonneret jaune.

Compte-rendu des activités (suite)

Dimanche 23 mai 2016
Parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard

Guide: Alain Quenneville

Par une belle journée chaude (23°C) et ensoleillée, 8 observateurs (7 + le guide) ont eu la chance d'observer les 53 espèces suivantes:

Bernache du Canada, canard colvert, canard branchu, harle couronné, cormoran à aigrettes, grand héron, butor d'Amérique, héron vert, goéland à bec cerclé, sterne pierregarin, urubu à tête rouge, busard Saint-Martin, buse à épaulettes, martin-pêcheur d'Amérique, gallinule d'Amérique, bécasseau minuscule, bécasseau semi-palmé, pic maculé, pic mineur, pic flamboyant, moucherolle tchébec, tyran huppé, tyran tritri, viréo mélodieux, viréo aux yeux rouges, geai bleu, corneille d'Amérique, hirondelle bicolore, hirondelle rustique, mésange à tête noire, sittelle à poitrine blanche, troglodyte des marais, merle d'Amérique, moqueur chat, étourneau sansonnet, paruline couronnée, paruline obscure, paruline jaune, paruline à tête cendrée, paruline bleue, paruline flamboyante, paruline masquée, Pirangua écarlate, bruant familier, bruant chanteur, bruant des marais, cardinal rouge, cardinal à poitrine rose, carouge à épaulettes, quiscale bronzé, oriole de Baltimore, chardonneret jaune et moineau domestique.

Le parc de L'Île Bizard est reconnu comme étant le meilleur site pour observer les oiseaux de la communauté urbaine de Montréal, et c'est pour vérifier cela que nous l'avons visité. Nous avons commencé notre visite par les environs de l'accueil du parc, dans l'espoir d'y voir quelques passereaux et nous n'avons pas été déçus. En effet, la paruline à tête cendrée, la paruline obscure, la paruline bleue et la très abondante paruline flamboyante se sont laissées facilement observer au grand plaisir de tous les participants. Par la suite, la visite des différents marais et marécages aménagés du site nous a permis d'observer de près des espèces normalement assez farouches comme le héron vert, le canard branchu, le harle couronné, le tyran tritri, le bruant des marais et le troglodyte des marais.

Mercredi 25 mai 2016
Marais de Saint-Timothée

Guide: Denis Gervais

Les participants ont pu observer les 39 espèces suivantes:

Bernache du Canada, Canard colvert, Fuligule à tête rouge, Fuligule à collier, Grèbe à bec bigarré, Cormoran à aigrettes, Butor d'Amérique, Petit Blongios, Grand Héron, Faucon émerillon, Pluvier kildir, Chevalier grivelé, Goéland à bec cerclé, Sterne pierregarin, Guifette noire, Tourterelle triste, Pic mineur, Pic flamboyant, Moucherolle des aulnes, Tyran tritri, Viréo mélodieux, Hirondelle bicolore, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Troglodyte familier, Troglodyte des marais, Grive fauve, Merle d'Amérique, Moqueur chat, Étourneau sansonnet, Paruline jaune, Paruline rayée, Paruline flamboyante, Paruline masquée, Bruant chanteur, Bruant des marais, Carouge à épaulettes, Quiscale bronzé, Oriole de Baltimore.

Samedi 28 mai 2016
Saint-Anicet et Godmanchester

Par une journée chaude (23°C) et venteuse, 5 participants (4+ le guide) ont pu voir les 70 espèces suivantes:

Bernache du Canada, canard colvert, grand héron, butor d'Amérique, goéland à bec cerclé, pluvier kildir, urubu à tête rouge, crécerelle d'Amérique, gélinotte huppée, dindon sauvage, pigeon biset, tourterelle triste, coulicou à bec noir, pic maculé, pic mineur, pic flamboyant, grand pic, pioui de l'Est, moucherolle des aulnes, moucherolle des saules, moucherolle tchébec, moucherolle phébi, tyran huppé, tyran tritri, viréo mélodieux, viréo aux yeux rouges, geai bleu, corneille d'Amérique, grand corbeau, hirondelle bicolore, hirondelle rustique, mésange à tête noire, sittelle à poitrine blanche, grimpereau brun, merlebleu de l'est, grive fauve, grive des bois, merle d'Amérique, moqueur chat, moqueur roux, étourneau sansonnet, jaseur d'Amérique, paruline à ailes bleues, paruline couronnée, paruline des ruisseaux, paruline obscure, paruline jaune, paruline à flancs marron, paruline noire et blanche, paruline rayée, paruline flamboyante, paruline masquée, Piranga écarlate, tohi à flancs roux, bruant familier, bruant sauterelle, bruant des prés, bruant chanteur, bruant des marais, bruant à gorge blanche, cardinal rouge, cardinal à poitrine rose, passerin indigo, goglu des prés, carouge à épaulettes, quiscale bronzé, vacher à tête brune, oriole de Baltimore, chardonneret jaune et moineau domestique.

Généralement, lors de cette dernière sortie de la saison, nous en profitons pour faire une tournée des secteurs de Saint-Anicet et de Huntingdon, à la recherche des spécialités aviaires de la région. C'est une sortie sans itinéraire préétabli d'avance, qui varie d'une année à l'autre, selon les goûts des participants et la présence d'espèces rares signalées dans la région visitée. Cette fois-ci, après un petit arrêt non fructueux sur le chemin des Planches, nous avons véritablement commencé la sortie par le chemin Biggar, où la paruline à ailes dorées et la paruline à ailes bleues avaient été observées quelques jours auparavant. Malheureusement, nous n'avons pas vu ni l'une ni l'autre des raretés du site. Par contre, une paruline de Brewster (l'hybride résultant du croisement entre la paruline à ailes dorées et la paruline à ailes bleues) s'est laissée observer facilement, ainsi que d'autres espèces toutes aussi intéressantes, comme le piranga écarlate, le moqueur roux et le tohi à flancs roux. Par la suite, nous avons fait un arrêt sur la montée Jamieson à Elgin, ce qui nous a permis d'y observer le rare bruant sauterelle , le goglu des prés, le passerin indigo et d'autres espèces communes. Pour finir, nous avons parcouru plusieurs chemins de la région de Huntingdon , ce qui nous a permis de trouver un butor d'Amérique assez bien camouflé dans un champ de foin du chemin Gowan, et de finalement observer une paruline à ailes bleues sur le Chemin Gore.

Bref, ce fût une merveilleuse sortie passée en excellente compagnie!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

AUTOMNE 2016

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Samedi 10 septembre 2016
Ste-Martine et Beauharnois

Ste-Martine est reconnu pour la présence d'oiseaux de rivage, tandis que le barrage de Beauharnois l'est pour la présence de goélands et de mouettes. Qui sait? Peut-être que ces deux sites nous réserveront de belles raretés.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 7h30

Durée de l'activité : 7 heures

Guide: Régis Fortin 450-601-5027

Dimanche 25 septembre 2016
Réserve du Lac St-François

La réserve est réputée pour ses nombreux oiseaux appartenant à toutes les familles. La migration d'automne bat son plein. Journée remplie de belles observations à prévoir.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 7h30

Durée de l'activité : 7 heures

Guide: Denis Gervais (450) 371-6514

Samedi 15 octobre 2016
Île Saint-Bernard

L'île Saint-Bernard constitue un joyau pour l'observation des oiseaux en toute saison. La migration d'automne tire à sa fin. Mésange bicolore et Pic à ventre roux devraient être au rendez-vous.

Lieu du rendez-vous: Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 8h00

Durée de l'activité : 3 heures

Guide: Alain Quenneville (514) 425-5499

Mercredi 19 octobre 2016
Conférence: de Houston à Tucson

Présentation multimédia de deux voyages de deux semaines (un au Texas et l'autre en Arizona). Au Texas: à partir de Houston, tous les sites visités jusqu'au Rio Grande ainsi que les oiseaux spéciaux découverts. Grand Canyon, déserts, montagnes et les alentours de Tucson compléteront la présentation de l'Arizona.

Lieu du rendez-vous : Édifice Raphaël-Barrette, 222 Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, à 19h30

Durée de l'activité : 2 heures

Conférencier: Gilles Cyr

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

AUTOMNE 2016 (SUITE)

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Dimanche 6 novembre 2016
Pont de St-Louis-de-Gonzague et barrage de Beauharnois

C'est l'automne. Eh oui! Les canards et les oies arrivent et font une halte de quelques semaines à St-Louis-de-Gonzague. Le barrage de Beauharnois accueille des goélands et des mouettes qu'on a moins souvent l'occasion d'observer.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 8h00

Durée de l'activité : 4 heures

Guide: Alain Hogue

Mercredi 23 novembre 2016
Conférence: LES HÉRONS

Les hérons sont des oiseaux échassiers. Une belle occasion d'en apprendre plus sur ces oiseaux qui vivent dans les zones humides, les lacs, les étangs et les cours d'eau, et qui se nourrissant de batraciens, de poissons et de rongeurs.

Lieu du rendez-vous : Édifice Raphaël-Barrette, 222 Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, à 19h30

Durée de l'activité : 2 heures

Conférencier: Régis Fortin

Dimanche 4 décembre 2016
La tournée des spots

La tournée des spots prend la relève de la tournée de l'avicourse de 2014. Ce sera l'occasion de visiter des sites où des espèces d'intérêt auront été signalées à ce moment ou dans les jours précédents.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 8h00

Durée de l'activité : au moins 4 heures

Guide: Alain Quenneville (514) 425-5499

Dimanche 18 décembre 2016
Décompte de Noël d'Audubon

Un secteur du territoire de la SOFA sera ratissé, afin de faire un décompte qui nous renseignera sur le nombre d'espèces et d'individus présents à ce moment de l'année. Selon le nombre de participants, l'activité durera de quatre à huit heures.

Il faut confirmer votre présence pour la formation des équipes, en communiquant avec le responsable Denis Gervais au 450-371-6514

Durée de l'activité : 4 à 8 heures

Résultats des excursions 2016

Alouette hausse-col	x	Durbec des sapins		Junco ardoisé	x	Petit duc maculé	x
Arlequin plongeur		Engoulevent bois-pourri		Macreuse à front blanc		Petit Fuligule	x
Autour des palombes		Épervier brun		Macreuse à bec jaune		Petit Garrot	x
Balbuzard pêcheur	x	Épervier de Cooper		Macreuse brune		Petite Buse	
Bécasse d'Amérique		Érismature rousse		Marouette de Caroline	x	Pic à dos noir	
Bécasseau à poitrine cendrée		Étourneau sansonnet	x	Martinet ramoneur		Pic à ventre roux	
Bécasseau minuscule	x	Faucon émérillon		Martin-pêcheur d'Amérique	x	Pic chevelu	x
Bécasseau semipalmé	x	Faucon pèlerin		Maubèche des champs		Pic flamboyant	x
Bécasseau variable		Foulque d'Amérique		Merle d'Amérique	x	Pic maculé	x
Bécassin roux		Fuligule à collier	x	Merlebleu de l'Est	x	Pic mineur	x
Bécassine de Wilson	x	Fuligule à tête rouge	x	Mésange à tête noire	x	Pic Tridactyle	
Bec-croisé bifascié		Fuligule milouinan	x	Mésange bicolore		Pie-grièche grise	
Bernache cravant		Gallinule d'Amérique	x	Moineau domestique	x	Pigeon biset	x
Bernache de Hutchins		Garrot à œil d'or	x	Moqueur chat	x	Pioui de l'Est	x
Bernache du Canada	x	Garrot d'Islande		Moqueur polyglotte		Piranga écarlate	x
Bihoreau gris		Geai bleu	x	Moqueur roux	x	Plectrophane des neiges	x
Bruant à couronne blanche		Gélinotte huppée	x	Moucherolle à cotés olive		Plectrophane lapon	x
Bruant à gorge blanche	x	Goéland à bec cerclé	x	Moucherolle à ventre jaune		Plongeon huard	x
Bruant chanteur	x	Goéland argenté	x	Moucherolle des aulnes	x	Pluvier bronzé	
Bruant de Lincoln		Goéland bourgmestre		Moucherolle des saules	x	Pluvier kildir	x
Bruant des champs		Goéland marin	x	Moucherolle phébi	x	Pluvier semipalmé	
Bruant des marais	x	Goglu des prés	x	Moucherolle tchébec	x	Pygargue à tête blanche	
Bruant des prés	x	Grand Chevalier		Mouette de Bonaparte		Quiscale bronzé	x
Bruant familier	x	Grand Corbeau	x	Mouette tridactyle		Quiscale rouilleux	x
Bruant fauve		Grand cormoran		Oie de Ross		Râle de Virginie	x
Bruant hudsonien	x	Grand Harle	x	Oie des neiges	x	Râle jaune	
Bruant sauterelle	x	Grand Héron	x	Oie des neiges forme bleue	x	Roitelet à couronne dorée	
Busard Saint-Martin	x	Grand pic	x	Oriole de Baltimore	x	Roitelet à couronne rubis	x
Buse à épaulettes	x	Grand-duc d'Amérique		Oriole des vergers		Roselin familier	x
Buse à queue rousse	x	Grande Aigrette	x	Paruline des pins		Roselin pourpré	x
Buse pattue		Grèbe à bec bigarré	x	Paruline à ailes bleues	x	Sarcelle à ailes bleues	
Butor d'Amérique	x	Grèbe esclavon		Paruline à ailes dorées		Sarcelle d'hiver	x
Canard branchu	x	Grèbe jougris		Paruline à collier		Sitelle à poitrine rousse	
Canard chipeau	x	Grimpereau brun	x	Paruline à croupion jaune	x	Sittelle à poitrine blanche	x
Canard colvert	x	Grive à dos olive		Paruline à flancs marron	x	Sizerin flammé	x
Canard d'Amérique	x	Grive des bois	x	Paruline à gorge noire		Sterne caspienne	
Canard noir	x	Grive fauve	x	Paruline à gorge orangée		Sterne pierregarin	x
Canard pilet	x	Grive solitaire	x	Paruline à joues grises		Sturnelle des prés	
Canard souchet		Gros-bec errant		Paruline à poitrine baie		Tarin des pins	
Cardinal à poitrine rose	x	Grue du Canada	x	Paruline à tête cendrée	x	Tohi à flancs roux	x
Cardinal rouge	x	Guifette noire		Paruline bleue	x	Tourterelle triste	x
Carouge à épaulettes	x	Harelde kakawi		Paruline couronnée	x	Troglodyte de Caroline	
Carouge à tête jaune		Harfang des neiges	x	Paruline des ruisseaux	x	Troglodyte des forêts	
Chardonneret jaune	x	Harle couronné	x	Paruline flamboyante	x	Troglodyte des marais	x
Chevalier grivelé	x	Harle huppé	x	Paruline jaune	x	Troglodyte familier	x
Chevalier solitaire		Héron vert	x	Paruline masquée	x	Troglodyte mignon	
Chouette lapone		Hibou moyen-duc		Paruline noir et blanc	x	Tyran huppé	x
Chouette rayée		Hirondelle à ailes hérissées		Paruline obscure	x	Tyran tritri	x
Colibri à gorge rubis	x	Hirondelle à front blanc		Paruline rayée	x	Urubu à tête rouge	x
Cormoran à aigrettes	x	Hirondelle bicolore	x	Paruline tigrée		Vacher à tête brune	x
Corneille d'Amérique	x	Hirondelle de rivage		Paruline verdâtre		Viréo à gorge jaune	
Coulicou à bec noir	x	Hirondelle noire		Passerin indigo	x	Viréo à tête bleue	
Crécerelle d'Amérique	x	Hirondelle rustique	x	Perdrix grise		Viréo aux yeux rouges	x
Cygne siffleur		Jaseur boréal		Petit Blongios		Viréo de Philadelphie	x
Dindon sauvage	x	Jaseur d'Amérique	x	Petit Chevalier		Viréo mélodieux	x

TOTAL: 127 espèces

Règlements et suggestions pour les activités

L'équipement

En plus de votre guide d'identification et de vos jumelles, assurez-vous de porter des vêtements et des chaussures de circonstance et de prévoir de la nourriture et des breuvages en fonction de la durée de l'activité.

Le covoiturage

Nous encourageons vivement le covoiturage lors des excursions. Il est de mise que chaque participant qui profitera de la voiture d'un autre lui verse une contribution de 0,05 $ du kilomètre.

Les invités

Si vous avez un ami ou un parent qui s'intéresse aux oiseaux, vous pouvez l'inviter à participer à une activité sans obligation de sa part. Les frais sont de 5 $.

Les enfants

L'observation des oiseaux est un magnifique loisir pour les enfants. Cependant, pour des raisons de sécurité, les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés d'un adulte.

Votre guide

Votre guide est là pour animer et diriger le groupe tout au long de la journée. N'hésitez pas à le questionner et à lui faire part de vos commentaires et suggestions. N'oubliez pas que votre guide est un membre qui a eu la gentillesse d'animer bénévolement votre excursion. Il est responsable des allées et venues du groupe et de l'application des règles d'éthique

Vous aimez les oiseaux ?

Abonnez-vous au magazine QuébecOiseaux !

Une revue sans but lucratif publiée par le Regroupement QuébecOiseaux

<u>Être abonné c'est</u> :

- **découvrir et partager la passion des oiseaux**
- **posséder un outil pédagogique et des références de qualité**
- **recevoir à domicile une revue exceptionnelle à un prix abordable**
- **aider à faire connaître et protéger les oiseaux du Québec.**



Je veux m'abonner au magazine QuébecOiseaux

☐ 22,95 $ - 4 numéros (1 an) ☐ Nouvel abonnement

☐ 39,95 $ - 8 numéros (2 ans) ☐ Renouvellement

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Code Postal : _____

Payable à : Regroupement QuébecOiseaux

□ Chèque □ Mandat poste □ MasterCard □ Visa

No de carte : _____

Date d'expiration : _____

Signature : _____

OU abonnez-vous en ligne à www.quebecoiseaux.org