

Le Picocheur

*Bulletin de la Société d'observation de la faune ailée du Sud-Ouest
C.P. 1231, Succursale A, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6S1
Janvier 2018 volume XXVIII numéro 1*



Moqueur polyglotte



Le Mot du Président

Bonjour,

Le mot du président sera court malgré qu'une image vaut mille mots.



Profitez des moments passés en nature

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE ANNÉE 2018 REMPLIE DE PETITS PLAISIRS

Denis Gervais, Président

Merci à Monsieur Alain Quenneville pour la photo de Moqueur polyglotte qui apparaît en page couverture. On a rarement l'occasion de rencontrer cette espèce dans notre région.

Moqueur polyglotte

Ce texte est tiré en grande partie du site internet (<http://www.oiseaux-birds.com/>). Les informations complémentaires sont tirées de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional (édition 1995)

Le moqueur polyglotte (*Mimus polyglottos*) appartient à la famille des Mimidés. Il s'agit par ailleurs du seul moqueur appartenant au genre *Mimus* que l'on retrouve au Canada. Il mesure de 21 à 26 cm, a une envergure qui va de 31 à 35 cm, et un poids de 45 à 58 gr. La durée de vie du moqueur polyglotte est de 20 ans.

Description

Le moqueur polyglotte est un oiseau chanteur de taille moyenne. Il a les parties supérieures gris terne (capuchon, dos, épaules et croupion), les parties inférieures sont blanchâtres (menton, gorge, poitrine, ventre). Les ailes présentent deux barres alaires blanches, et de larges taches, blanches aussi, très visibles en vol. La queue est longue avec les rectrices externes blanches, et les médianes noires. Ses yeux sont jaunes, ou oranges, et une fine ligne noire les traversent. Son bec est fin et de couleur noire. Ses pattes sont longues et de couleur foncée. Le juvénile ressemble à l'adulte, mais il est plus brun sur le dessus, et possède de grandes taches brun clair sur les parties inférieures, depuis la gorge jusqu'en haut de l'abdomen et sur les flancs.

Cris et chants

Le chant est constitué de longues phrases répétées, un peu gargouillantes ou flutées. Cet oiseau est connu pour sa capacité à imiter le chant des autres oiseaux (plus de 200 espèces) avec néanmoins quelques variations: le chant imité est plus rapide et de volume sonore plus élevé. Il est aussi capable d'imiter des chats, des chiens, des humains, des sirènes d'alarme, des bruits de voiture et d'autres sons. Le moqueur polyglotte chante beaucoup et même la nuit, en particulier dans les zones urbaines où il peut bénéficier des éclairages artifi-

ciels. Chaque individu possède son répertoire particulier et seules quelques bribes sont communes. Les 2 sexes chantent. On peut également entendre quelques cris : un "chuck" ou un "churr" rauque, ainsi qu'un "hiou" grinçant.

Vol

Le moqueur polyglotte vole avec de lents battements d'ailes. En vol, on peut voir aisément les grandes taches blanches qui ornent ses ailes. Mais son vol est aussi très agile quand il poursuit des intrus ou qu'il chasse des insectes en vol.

Habitat

Le moqueur polyglotte fréquente les zones de buissons clairsemés, les terres agricoles abandonnées, les lisières de forêts, toutes sortes de contrées ouvertes. Il est capable de s'adapter aux paysages urbains dans la mesure où ces derniers possèdent des zones de végétation suffisantes pour accueillir les nids. Il est absent à l'intérieur des forêts denses. Il affectionne les taillis épais et les bordures de forêt. Il défend un territoire en toute saison et protège ainsi ses sources de nourriture en hiver.

Alimentation

Le moqueur polyglotte est omnivore. Il consomme des arthropodes, des coléoptères, des fourmis, des guêpes, des abeilles, des sauterelles, des araignées, des vers de terre et quelquefois des petits lézards. Il ingurgite également des matières végétales, en particulier des baies. Son régime est composé surtout de matières animales en été et de végétaux en hiver. La consommation de fruits provenant du rosier multiflore (qui est une plante envahissante) a joué un rôle important dans l'expansion de son aire de distribution.

Lorsqu'il est en chasse, cet oiseau réalise plusieurs mouvements caractéristiques, tels que des mouvements nerveux de la queue d'un côté et de l'autre, ou lorsqu'il est au sol, de brusques séries d'ouverture et fermeture des ailes, supposées effrayer les insectes dissimulés et les forcer à bouger.

Comportement

C'est un oiseau familier que l'on peut observer à loisir. Il passe une grande partie de son temps à terre, courant et sautillant. Bien qu'il chasse parfois à faible hauteur dans les airs à la manière d'un moucherolle, il capture la plupart de ses proies sur le sol. On l'a déjà aperçu utilisant une méthode de chasse surprenante et fort peu conventionnelle : il rattrape une cigale en vol, la percute avec ses ailes avant de la saisir dans son bec. Le moqueur polyglotte est un chasseur agressif également, poursuivant une sauterelle sur le sol, en courant, en sautant et en s'élançant brusquement en avant pour saisir sa proie. Il peut aussi voler juste au-dessus du sol derrière une guêpe.

Le moqueur polyglotte est hautement territorial, et peut attaquer n'importe quel intrus, animal ou humain. Très agressif, il poursuit jusqu'à l'extérieur du territoire, les autres oiseaux et les mammifères. Il a été observé chassant de grands oiseaux hors du site du nid, tels que des corvidés ou des rapaces. Il agite les ailes de haut en bas en comportement territorial et nuptial, exhibant les taches blanches de ses ailes.

Reproduction

Le moqueur polyglotte est monogame au moins le temps d'une saison, mais parfois, il s'accouple pour la vie. Il est habituellement monogame, mais des cas de bigamie et même de trigamie ont déjà été rapportés.

Lors de la saison de reproduction, le comportement des mâles devient exubérant: performances aériennes, chants en vol et

nombreux déplacements d'un perchoir à un autre visent à attirer l'attention des femelles.

Au printemps commence la parade nuptiale, avec des vols acrobatiques: le mâle poursuit la femelle, se pose tout près d'elle et s'envole avec elle lorsqu'elle s'envole. Un autre comportement intéressant du mâle, lors de la parade nuptiale, est de sauter d'un perchoir, en battant des ailes, pour s'élever d'un mètre à peine et redescendre doucement avec les ailes ouvertes comme un parachute pour se poser à nouveau sur son perchoir.

Le nid est une coupe ouverte construite avec des petites brindilles de bois mort et garnie avec des herbes. La structure extérieure est bâtie presque entièrement par le mâle, alors que la garniture intérieure est l'œuvre presque exclusive de la femelle. La plupart des nids sont placés dans un arbuste ou dans un buisson, à une hauteur de 3 mètres, bien que certaines constructions se situent parfois jusqu'à 19 m au-dessus du sol. Très occasionnellement, certains sont installés dans des immeubles ou dans des cavités. Souvent, le nid étant construit assez près du sol, dans des buissons ou des arbres, son accessibilité le rend vulnérable aux dérangements, et les oiseaux peuvent abandonner les œufs en cours d'incubation. Mais en revanche, les parents n'abandonneront pas le nid si les poussins sont déjà nés.

La ponte comprend 2 à 6 œufs gris bleuâtre ou blanc verdâtre avec différentes nuances de bleu et de vert. Ils sont abondamment tachés de nombreuses sortes de brun. Les œufs bleu pâle sans taches sont extrêmement rares. La femelle couve seule pendant une période qui dure uniquement 12 ou 13 jours. Les jeunes sont nourris par les deux parents. Quand ceux-ci atteignent l'âge de 12 jours, ils s'aventurent hors du nid, et sautillent aux alentours sur le sol ou en bas des buissons. Les jeunes sont nourris par les parents plus de cinq fois par heure. Le couple continue à prendre soin d'eux pendant plusieurs jours jusqu'à ce

qu'ils sachent se nourrir eux-mêmes. Chaque couple produit deux ou trois couvées par saison, et le mâle s'occupe des premiers jeunes tandis que la femelle couve les œufs.

Répartition

Le moqueur polyglotte est endémique de l'Amérique du Nord. Il est présent sur tout le territoire des États-Unis, partout où il trouve des habitats qui lui conviennent. Au nord, son aire de répartition déborde légèrement sur le Canada, notamment en Colombie Britannique, dans la région des Grands Lacs ainsi que dans le sud du Québec et dans les provinces maritimes. Au sud, son aire se poursuit largement au Mexique jusque dans la province du Chiapas. Cet oiseau est également présent aux Antilles. Il a été introduit aux Bermudes et à Hawaï. Trois sous-espèces sont officiellement reconnues : M.P. polyglottos, la race type (est de l'Amérique du Nord, de l'est du Nebraska jusqu'à la Nouvelle-Ecosse et de l'est du Texas jusqu'à la Floride) - M.P. leucopterus (ouest de l'Amérique du Nord, du nord-ouest du Nebraska et de l'ouest du Texas jusqu'au littoral du Pacifique, également au Mexique jusqu'à Mexico et l'isthme de Tehuantepec) - M.P. orpheus (Bahamas, Grandes Antilles à l'est des îles Vierges).

Au Canada, ce moqueur est un résident permanent mais rare, partout au pays. Il étend lentement son aire de répartition vers le nord du continent.

Bien que cet oiseau soit sédentaire sur la plus grande partie de son aire de répartition, il montre d'évidentes dispositions à se déplacer. On ne peut pas parler véritablement de migration, car plus de 90% des mouvements enregistrés sont inférieurs à 200 kilomètres. Pour renforcer cette impression, il convient d'ajouter que, contrairement au moqueur chat, ces mouvements ne sont pas forcément orientés du nord vers le sud et restent la plupart du temps à la même latitude.

Menaces

En Amérique du Nord le moqueur polyglotte est commun et largement répandu. Les populations semblent décliner au cœur de son habitat, mais cet habitat a tendance à s'étendre vers le nord. Malgré les nombreux prédateurs tels que les serpents, les rapaces nocturnes, les corvidés et les éperviers, l'espèce est loin d'être menacée.

Situation et tendance au Québec

Au Québec, le moqueur polyglotte est considéré comme un nicheur migrateur plutôt rare. De plus, chaque hiver, quelques individus tentent d'hiverner, mais ils n'y parviennent pas tous.

Où et quand observer le Moqueur polyglotte dans le territoire de la SOFA:

Comme partout au Québec, le moqueur polyglotte est une espèce rare et localisée dans la région. Mais il existe un endroit où son observation est plus fréquente d'année en année, et c'est dans la localité de Beauharnois. En effet, presque à chaque été, un couple de moqueur polyglotte niche près du stationnement situé en face du barrage de Beauharnois, près des écluses. C'est pourquoi il arrive souvent en hiver qu'un de ces oiseaux soit vu se nourrissant de baies et de fruits dans le village de Beauharnois situé pas très loin de son site de nidification. On l'a vu parfois sur un terrain privé mais aussi souvent dans un parc comme celui au bout de la rue de la Couturière où les arbres fruitiers abondent. Donc, pour trouver un moqueur polyglotte dans notre région, l'hiver, il faut chercher sa nourriture, soit des petits fruits et, pour ce faire, il faut chercher des endroits comme certains quartiers ou certains parcs urbains où les arbres fruitiers sont abondants.

AIDEZ-NOUS À RECRUTER DE NOUVEAUX MEMBRES

Vous connaissez un ami, un parent qui cherche une activité de plein air à un prix abordable? Pourquoi ne pas lui parler de la SOFA?

Seul ou en famille, la SOFA lui propose de partir à la découverte du merveilleux monde des oiseaux en compagnie de guides qualifiés. Se joindre à un club d'ornithologie lui permettra également de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts et d'échanger sur une foule de sujets reliés à la nature, la faune et la flore.



COUPON D'ABONNEMENT À LA SOFA

NOM : _____

TÉLÉPHONE : (____) _____

ADRESSE : _____

CODE POSTAL : _____

VILLE : _____

COURRIEL : _____

NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE : _____ (Coût annuel de 25 \$)

Cochez s'il y a lieu: ☐ « Je refuse que mes coordonnées soient divulguées à d'autres organismes. »

La contribution annuelle pour adhérer à la SOFA est de 25 \$. Votre adhésion est familiale, c'est à dire qu'elle s'applique à votre conjoint (e) ainsi qu'à vos enfants résidant à la même adresse.

Veuillez nous faire parvenir cette fiche d'adhésion ainsi que votre chèque à l'adresse suivante :

**SOFA, C.P. 1231, SUCC. A
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC) J6S 6S1**

Les faits saillants fin-été automne 2017

Le temps anormalement chaud du début du mois de septembre s'est maintenu jusqu'à la fin d'octobre. Ce n'est qu'aux premiers jours de novembre que les températures ont finalement atteint les normales de saison. Le froid a vraiment débuté lors de la deuxième semaine de décembre avec une belle grosse bordée de neige qui n'a pas vraiment fondu complètement depuis. Ce temps hivernal s'est maintenu une bonne partie du mois de décembre avec quelques épisodes de précipitations de neige abondantes.

Bécasseaux

Les bécasseaux ont été rares cette saison du côté de l'Anse-de-Vaudreuil, le niveau de l'eau du lac des Deux-Montagnes était trop haut. Même chose du côté de la carrière Meloche: les berges étaient presque inexistantes. Cette carrière est située au bout de la montée Saint-Dominique à Les Cèdres. Par contre, les observations de limicoles ont été plus intéressantes cet automne du côté du Domaine-de-la-pêche-au-saumon près du barrage de Sainte-Martine. On a pu y voir des espèces comme le pluvier argenté, le bécasseau sandering, le bécasseau variable, le bécasseau à poitrine cendrée et le bécasseau à croupion blanc (plusieurs observateurs).

Bernache cravant

Soixante individus ont été observés en vol le 7 octobre à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de Hungry Bay (R.F.). Les oiseaux se dirigeaient vers le fleuve Saint-Laurent du côté de Saint-Zotique. Douze individus ont été vus en vol le 21 octobre et quinze le 4 novembre toujours dans le même secteur (plusieurs observateurs). Un individu a été vu régulièrement du 4 au 11 novembre sur le canal de Beauharnois, de son embouchure jusqu'au pont Larocque (plusieurs observateurs).

Bernache nonnette

Un individu a été observé le 4 novembre à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de

Hungry Bay (plusieurs observateurs).

Dindon sauvage

De nombreux groupes familiaux (jusqu'à 15 individus) ont été observés d'août à décembre à Saint-Stanislas-de-Kostka, Huntingdon, Saint-Anicet et Dundee ainsi que dans les régions de Saint-Clet, Sainte-Marthe, Rigaud et Sainte-Justine-de-Newton (plusieurs observateurs).

Faucon pèlerin

Les couples qui occupent la structure des ponts Larocque et de Saint-Louis-de-Gonzague, le long du canal de Beauharnois, ont été observés régulièrement d'octobre à décembre (plusieurs observateurs). Les oiseaux fréquentent encore les environs de leur site de nidification au moment d'écrire ces lignes, soit à la fin de décembre. Un troisième couple a été observé régulièrement en novembre et décembre sur la structure du nouveau pont de l'autoroute 30 qui traverse le canal de Beauharnois, le pont Madeleine-Parent (plusieurs observateurs).

Goéland brun

Un individu immature de première année a été observé le 9 décembre dans les rapides en face du barrage hydroélectrique de Beauharnois (D.O.)

Grande Aigrette

Elles ont été observées régulièrement jusqu'à la fin octobre à Sainte-Martine, au

bout de la rue MacDonald à Maple Grove ainsi qu'aux marais de Saint-Timothée et de Saint-Étienne-de-Beauharnois (jusqu'à 15 individus). Elles étaient aussi présentes jusqu'au 12 novembre, dans le marais de Saint-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs observateurs).

Grèbe esclavon

Quatre individus en plumage inter nuptial ont été observés pour la première fois de la saison le 18 octobre à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de Hungry Bay (plusieurs observateurs). Un peu moins d'une semaine plus tard, soit le 23 octobre, 9 individus ont été observés au même endroit (P.L.). Le 28 octobre, seulement un individu était présent à l'embouchure du canal. L'oiseau a été vu régulièrement sur le site jusqu'au 11 décembre (plusieurs observateurs). Neuf individus ont été vus le 21 novembre sur le fleuve Saint-Laurent au niveau de la Baie-des-Brises toujours à Saint-Stanislas-de-Kostka (F.H.). Deux individus ont été observés ensemble du 4 au 24 novembre sur le canal de Beauharnois au niveau du pont Larocque du côté de Saint-Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs). Un dernier individu est demeuré au même endroit jusqu'au 9 décembre (plusieurs observateurs).

Grèbe jougris



Un individu en plumage nuptial a été observé le 6 septembre à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de Hungry Bay (R.F.).

Deux individus, un immature et un adulte en plumage presque nuptial, ont été observés le 7 octobre dans l'étang principal de la carrière Meloche (plusieurs observateurs). Cette carrière est située au bout de la montée Saint-Dominique à Les Cèdres. Quatre individus en plumage inter nuptial ont été observés du 4 au 18 octobre à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de Hungry Bay (plusieurs observateurs). Au moins deux de ces individus ont été vus régulièrement au même endroit, un à la fois ou ensemble, jusqu'au 15 novembre (plusieurs observateurs). Un individu a été observé les 9 et 10 décembre sur le canal de Beauharnois à la hauteur du pont Larocque du côté de Saint-Stanislas-de-Kostka (J.Cô. et P.L.). Le 11 décembre, deux individus ont été observés à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de Hungry Bay (M.C.). Ce fût les derniers grèbes jougris observés dans la région cet automne.

Grue du Canada

Sept individus ont été vus et entendus régulièrement, en juillet, août et septembre, posés par groupe de deux ou trois dans le marais du sentier de la digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs). Le 2 octobre, vingt individus ont été observés à cet endroit (W.H.). Un peu plus de deux semaines plus tard, le 18 octobre, le nombre d'individus est passé à 25 (plusieurs observateurs). Le maximum d'individus sur le site de la réserve a été atteint le 8 novembre avec 30 individus (W.H.). Les oiseaux fréquentaient assidûment un champ cultivé situé le long de la route 132, pas très loin à l'est de l'entrée du sentier de la digue aux Aigrettes (plusieurs observateurs). Quatre de ces oiseaux ont été vus sur le site pour la dernière fois le 10 décembre (M.J.).

Harelde kakawi

Cinq individus ont été observés le 17 octobre à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de Hungry Bay (D.S.). Le 4 novembre, treize individus ont été observés dans le même secteur (plusieurs observateurs). Six de ces individus ont été vus à cet endroit jusqu'au 17 novembre (plusieurs observateurs). Deux de ces individus ont été vus régulièrement dans le même secteur jusqu'au 11 décembre (plusieurs observateurs). Deux individus ont été observés ensemble du 4 novembre au 8 décembre sur le canal de Beauharnois au niveau du pont Larocque du côté de Saint-Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs). Le 9 décembre trois individus ont été vus au même endroit (P.L.).

Harfang des neiges



Une jeune femelle a été observée le 12 novembre sur le brise-vague situé à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de Hungry Bay (plusieurs observateurs). Les 13 et 14 novembre l'oiseau a été vu sur un baril jaune situé sur le fleuve Saint-Laurent en face de l'embouchure du canal (plusieurs observateurs). Dès le 28 novembre, deux individus ont été observés sur la montée Léger à Côteau-du-Lac (plusieurs observateurs). Dès le 3 décembre une femelle, s'est mis à fréquenter les abords des autoroutes 20 et 30 entre Les Cèdres et Vaudreuil-Dorion (plusieurs observateurs). Un individu a été observé le 14 décembre sur la montée

Cholette à Sainte-Marthe (M.B.). Un dernier individu a été observé le 20 décembre sur le chemin Saint-Émanuel à Saint-Clet (J.C.).

Macreuses

Une macreuse à front blanc a été observée le 8 octobre à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de Hungry Bay (P.L.). Le 16 octobre, 48 macreuses brunes, cinq macreuses à bec jaune et deux macreuses à front blanc ont été observées au même endroit (Plusieurs observateurs). En novembre, tout le long du canal de Beauharnois, de son embouchure jusqu'au barrage, le nombre d'individus observés par espèce a grandement diminué, allant à un maximum de trois macreuses à front blanc, de sept macreuses à bec jaune et de cinq macreuses brunes vues en même temps (plusieurs observateurs). La dernière macreuse à front blanc de la région, cet automne, a été observée le 4 décembre à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka, secteur de Hungry Bay (J.M.). Au moment d'écrire ces lignes, soit à la fin de décembre, une macreuse brune est toujours présente à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka et une macreuse à bec jaune femelle est encore présente à la Halte du pêcheur, dans la baie près du pont de Saint-Louis-de-Gonzague, toujours du côté de Salaberry-de-Valleyfield, secteur de Saint-Timothée (plusieurs observateurs).

Mésange bicolore

D'octobre à décembre, jusqu'à quatre individus ont été observés aux mangeoires de madame Christiane Meloche à sa résidence du chemin du canal à Saint-Stanislas-de-Kostka, dans le secteur de Hungry Bay (plusieurs observateurs).

Mouette rieuse

Un adulte en plumage d'hiver a été observé le 9 décembre dans les rapides en face

du barrage hydroélectrique de Beauharnois (D.O.).

Oie à bec court

Un individu a été observé, le 15 novembre, nageant parmi les oies des neiges sur l'étang situé près du pont de Saint-Louis-de-Gonzague, du côté de Salaberry-de-Valleyfield, secteur de Saint-Timothée (M.L. B. et C.B.).

Oie de Ross

Deux individus ont été observés, le 11 novembre, nageant parmi les oies des neiges, sur l'étang situé près du pont de Saint-Louis-de-Gonzague, du côté de Salaberry-de-Valleyfield, secteur de Saint-Timothée (J.McG.). Le lendemain, trois individus ont été observés au même endroit (plusieurs observateurs). Le 25 novembre, deux individus ont été observés pour la dernière fois sur l'étang avant que la glace ne recouvre complètement le site (F.H.). Un individu a été observé le 24 décembre à la Halte du pêcheur, c'est à dire, dans la baie près du pont de Saint-Louis-de-Gonzague, toujours du côté de Salaberry-de-Valleyfield, secteur de Saint-Timothée (D.J.).


Oie rieuse

Un premier individu a été observé, le 25 septembre, sur le terre-plein entre les autoroutes 20 est et 20 ouest, entre les sorties St-Emmanuel et St-Dominique à la limite de Les Cèdres et de Côteau-du-lac (S.C. et R.L.). Un autre individu a été observé le 31 octobre au milieu de plus de 2000 bernaches du Canada, dans un champ situé en bordure de la montée Lavigne à Rigaud (W.G.). Un individu a été observé le 4 novembre nageant parmi les oies des neiges sur l'étang situé près du pont de Saint-Louis-de-Gonzague, du côté de Salaberry-de-Valleyfield, secteur de Saint-Timothée (F.H.). Un autre individu a été observé le 25 novembre à la halte des Iroquois parmi une petite bande de bernaches du Canada (F.H.). Cette halte est située le long de la route 132, un peu avant le parc de la Poin-

te-du-Buisson à Melocheville. Un dernier individu a été observé les 3 et 4 décembre parmi près de 2000 bernaches du Canada dans l'étang principal de la carrière Meloche (plusieurs observateurs). Cette carrière est située au bout de la montée Saint-Dominique à Les Cèdres.

Plongeon catmarin

Au moins deux individus en plumage inter



nuptial ont été observés régulièrement du 26 septembre au 17 novembre sur le canal de Beauharnois, de son embouchure jusqu'à la hauteur du pont Larocque (plusieurs observateurs). Un de ces deux individus était présent du 11 au 18 novembre sur le canal de Beauharnois à la hauteur de la Halte du pêcheur, c'est à dire, dans la baie située près du pont de Saint-Louis-de-Gonzague, du côté de Salaberry-de-Valleyfield, secteur de Saint-Timothée (plusieurs observateurs). Un dernier individu a été observé le 9 décembre sur le fleuve Saint-Laurent en face du barrage hydroélectrique de Beauharnois (S.D.).

Pygargue à tête blanche

Un adulte et un immature ont été vus régulièrement en novembre et décembre le long du canal de Beauharnois, de son embouchure jusqu'aux environs du barrage de Beauharnois (plusieurs observateurs). Au moins deux adultes et un immature ont été vus régulièrement en novembre et décembre sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (plusieurs observateurs).

Vous pouvez contacter Denis Gervais au 371-6514 ou Alain Quenneville au (514) 425-5499 pour signaler vos observations

Observateurs :

C.B.	Cindy Bélanger
D.J.	Daniel Jauvin
D.O.	Daniel Ouellette
D.S.	Denise Simon
F.H.	Frédéric Hareau
J.C.	Jasmine Cantara
J.Cô.	Jean Côté
J.M.	Joanne Masson
J. McG.	Joe McGill
M.B.	Michel Bourque
M.C.	Michel Chalifoux
M.J.	Michel Juteau
M.L. B.	Marie-Lise Beaudin
P.L.	Patrick Laniel
R.F.	Régis Fortin
R.L.	Rémi Laurin
S.C.	Sébastien Castagnier
S.D.	Samuel Denault
W.G.	Wayne Grubert
W.H.	Wido Hoville



hello!



NUMÉROS DE TÉLÉPHONES OU ADRESSES À RETENIR

Activités	Denis Gervais	(450) 371-6514
Trésorerie	Réal Leduc	administration@sofaso.com
Faits saillants	Alain Quenneville	(514) 425-5499
Révision eBird	Régis Fortin	(450) 601-5027
S.O.S. Braconnage		1-800-463-2191

Comment faire pour signaler une observation ?

Vous avez observé une espèce que vous croyez digne de mention? N'hésitez pas! Contactez Denis Gervais au (450) 371-6514.

Compte-rendu des activités

Samedi 16 septembre 2017
Sainte-Martine et Beauharnois

Guide: Alain Quenneville

Par une belle journée ensoleillée, 7 observateurs (6 + le guide) on pu observer les 34 espèces suivantes:



Canard colvert, sarcelle d'hiver, cormoran à aigrettes, grand héron, grande aigrette, bihoreau gris, balbuzard pêcheur, pluvier kildir, bécasseau à poitrine cendrée, bécasseau semi palmé, chevalier grivelé, grand chevalier, petit chevalier, goéland à bec cerclé, goéland argenté, goéland

marin, tourterelle triste, martin-pêcheur d'Amérique, pic mineur, pic flamboyant, faucon émerillon, moucherolle phébi, viréo mélodieux, geai bleu, corneille d'Amérique, grand corbeau, mésange à tête noire, merle d'Amérique, étourneau sansonnet, paruline à poitrine baie, paruline à croupion jaune, roselin familier, chardonneret jaune et moineau domestique.

Le but de cette sortie est principalement d'observer les limicoles et les laridés qui abondent normalement aux barrages de Sainte-Martine et de Beauharnois au début de septembre. Nous avons donc débuté notre sortie au Domaine de la pêche au Saumon de Sainte-Martine. Sur place nous avons pu observer quelques limicoles surtout quelques petits chevaliers. En fouillant un peu plus, on a pu ajouter le grand chevalier, le chevalier grivelé, le bécasseau semi palmé, le bécasseau à poitrine cendrée et le pluvier kildir à nos observations de la journée. Mais l'oiseau qui a vraiment retenu toute l'attention du groupe a certainement été le balbuzard pêcheur qui, arrivé de nulle part, s'est posé directement en face du groupe, en bordure d'une petite île et a commencé tranquillement à se baigner dans la rivière au grand plaisir de tous les participants. Par la suite, nous avons fait une visite au barrage de Beauharnois et plus tard, à la marina de Beauharnois, dans le but de rechercher des mouettes et des goélands. Les oiseaux recherchés n'étant pas au rendez-vous, nous avons décidé d'un commun accord de mettre fin à la sortie.

Compte-rendu des activités (suite)

Samedi 30 septembre 2017 Réserve Nationale de Faune du Lac Saint-François

Guide: Denis Gervais

Ce fût une sortie faite en collaboration avec Les Amis de la Réserve. Il y a eu dix-neuf participants en matinée, sur le sentier de la digue aux aigrettes, pour 34 espèces. En après-midi, six participants ont parcouru le secteur Piasetski pour ajouter 10 espèces.

Liste des espèces:



Bernache du Canada, Canard branchu, Canard noir, Canard colvert, Sarcelle à ailes bleues, Fuligule à collier, Grèbe à bec bigarré, Butor d'Amérique, Urubu à tête rouge, Buisson des marais, Épervier de Cooper, Buse à queue rousse, Râle de Virginie, Grue du Canada, Tourterelle triste, Martin-pêcheur d'Amérique, Pic maculé, Pic mineur, Pic chevelu, Pic flamboyant, Grand Pic, Faucon émerillon, Moucherolle phébi, Viréo à tête bleue, Geai bleu, Corneille d'Amérique, Mésange à tête noire, Sittelle à poitrine blanche, Grimpereau brun, Troglodyte des marais, Roitelet à couronne dorée, Roitelet à couronne rubis, Merle d'Amérique, Moqueur chat, Étourneau sansonnet, Paruline masquée, Paruline à tête cendrée, Bruant chanteur, Bruant des marais, Bruant à gorge blanche, Junco ardoisé, Carouge à épauettes, Quiscale rouilleux, Chardonneret jaune.

Compte-rendu des activités (suite)

Samedi 14 octobre 2017
Île Saint-Bernard

Guide: Alain Quenneville

Par une belle journée fraîche (15°C) mais ensoleillée, 4 participants (3 + le guide) ont pu voir les 40 espèces suivantes:

Bernache du Canada, canard branchu, canard colvert, sarcelle d'hiver, harle huppé, plongeon huard, grèbe à bec bigarré, grèbe jougris, cormoran à aigrettes, grand héron, grande aigrette, urubu à tête rouge, busard des marais, bécassine de Wilson, goéland à bec cerclé, pigeon biset, tourterelle triste, martin-pêcheur d'Amérique, pic mineur, pic chevelu, pic flamboyant, faucon pèlerin, geai bleu, corneille d'Amérique, grand corbeau, mésange à tête noire, mésange bicolore, sittelle à poitrine blanche, grimpereau brun, troglodyte des forêts, roitelet à couronne rubis, grive solitaire, merle d'Amérique, étourneau sansonnet, paruline à croupion jaune, bruant à couronne blanche, bruant à gorge blanche, bruant chanteur, cardinal rouge et carouge à épaulettes.



Pour maximiser le nombre d'espèces d'oiseaux observés lors d'une visite à l'Île Saint-Bernard, on prend généralement le sentier qui mène à la Pointe Nord et au retour, on passe par la Grande Digue. Et si ce n'est pas assez, et que certains participants ont toujours le goût de continuer, on peut compléter la visite de l'Île en après-midi, en faisant le tour des deux digues. Nous avons donc débuté la sortie en prenant la direction de la Pointe Nord. À l'arrivée à la Plage du Grillon, nous avons observé une petite bande d'oiseaux de mangeoire comme la mésange à tête noire, la sittelle à poitrine blanche, le pic mineur, ainsi qu'une espèce plus rare, la mésange bicolore, ça augurait bien pour le reste de la sortie. Malheureusement, nous avons observé peu d'oiseaux avant notre arrivée à la grande digue et ce n'est que pas-

sé le secteur de la Pointe Ouest que nous avons pu augmenter notre liste d'espèces de la journée, en tombant sur quelques oiseaux aquatiques assez coopératifs. Des oiseaux comme le harle huppé, le grèbe jougris et le plongeon huard; c'est tout ce qu'il nous fallait pour faire de cette sortie une vraie journée d'observation d'oiseaux. Par la suite, considérant que notre visite de l'île était somme toute assez tranquille, nous avons décidé de changer un peu notre parcours en oubliant la grande digue et de passer plutôt par la petite digue, où on nous avait dit que la variété d'oiseaux était plus intéressante. Ce fût une sage décision, car nous avons pu y dénicher deux bécassines de Wilson, quelques canards branchus, des sarcelles d'hiver, des grands hérons et plusieurs grandes aigrettes, toutes espèces discrètement surveillées par un jeune faucon pèlerin perché tout près. Par la suite, puisque le reste du trajet de retour vers l'accueil s'était déroulé sans grandes surprises, nous avons donc décidé, d'un commun accord, de ne pas explorer les autres sentiers du parc et de mettre un terme à l'excursion.

Bref, ce fût une merveilleuse sortie faite en d'excellentes compagnies!

Compte-rendu des activités (suite)

Dimanche 12 novembre 2017
Du Pont de St-Louis-de-Gonzague à Hungry Bay

Guide: Alain Hogue

Temps gris, température froide, sans vent.

8 participants

Beaucoup d'espèces d'intérêt (en majuscules) parmi les suivantes:



Oie des neiges, OIE DE ROSS, BERNACHE DE HUTCHINS, Bernache du Canada, Canard colvert, MACREUSE À FRONT BLANC, MACREUSE BRUNE, MACREUSE À BEC JAUNE, Grand Harle, Fuligule sp., Garrot à oeil d'or, Canard chipeau, Canard d'Amérique, Canard noir, Fuligule à collier, Fuligule milouinan, Harle couronné, SARCELLE D'HIVER, PLONGEON CATMARIN, Plongeon huard, GRÈBE JOUGRIS, GRÈBE À BEC BIGARRÉ, Cormoran à aigrettes, Goéland argenté, FAUCON PÉLERIN, Pigeon biset, HARFANG DES NEIGES, Pic mineur, Mésange à tête noire, MÉSANGE BICOLORE, Merle d'Amérique, Corneille d'Amérique, Bruant chanteur.



Compte-rendu des activités (suite)

Dimanche 3 décembre 2017

La tournée des spots

Par une belle journée nuageuse et sans vent (7°C), 4 observateurs (3+ le guide) ont observé les 30 espèces suivantes:

Oie des neiges, bernache du Canada, canard noir, canard colvert, fuligule à dos blanc, fuligule à collier, fuligule milouinan, petit fuligule, macreuse brune, garrot à oeil d'or, harle couronné, grand héron, grande aigrette, buse à queue rousse, buse pattue, goéland à bec cerclé, goéland marin, pigeon biset, harfang des neiges, pic à tête rouge, pic à ventre roux, pic mineur, pic chevelu, faucon pèlerin, corneille d'Amérique, mésange à tête noire, mésange bicolore, sittelle à poitrine blanche, bruant hudsonien et chardonneret jaune.



Cette sortie avait pour but la recherche des dernières espèces migratrices retardataires et des premiers oiseaux hivernants arrivés dans la région. Pour ce faire, on visite normalement les points chauds des environs de Salaberry-de-Valleyfield. Souvent, ces points chauds, à l'approche de l'hiver, se résument aux points d'eau encore libres de glace. Cette année, la glace étant inexistante partout sur le territoire de la SOFA, en ce début de décembre, nous aurions donc dû concentrer nos efforts le long du canal de Beauharnois, mais la présence de quelques espèces rares au refuge Marguerite D'Youville a plutôt orienté notre choix vers une visite de l'Île Saint-Bernard à Châteauguay. Une fois sur place, nous nous sommes rapidement dirigés vers l'érablière à caryers, où un pic à tête rouge était vu régulièrement depuis plusieurs jours. L'oiseau y était et s'est laissé facilement observer au grand plaisir de tous les participants. Par la suite, sur le chemin du retour, vers l'entrée du

parc, nous avons pu observer dans les arbres, sur le long du sentier, un pic à ventre roux, une espèce qui n'est pratiquement observable qu'à cet endroit dans la province. En longeant la rivière Châteauguay, toujours sur le chemin du retour, nous sommes aussi tombés sur une grande aigrette, un oiseau assez rare et presque impossible à observer en décembre au Québec. Après l'île Saint-Bernard, nous sommes allés au parc de la Commune, situé juste à la sortie de l'île, dans l'espoir, en longeant la rivière, de mieux voir la grande aigrette. Nous ne l'avons pas trouvé, mais nous sommes tombés sur un grand héron, une autre espèce rare en décembre. Notre troisième arrêt a été le parc Sainte-Marie à La Prairie, là où un fuligule à dos blanc femelle se tenait depuis quelques jours. Une fois sur place, nous avons facilement trouvé l'oiseau au milieu de trois autres espèces de fuligule plus communes. Notre dernier arrêt s'est fait à la carrière Meloche, sur le chemin du retour, là où, le matin même, une oie rieuse avait été vue au milieu de plusieurs centaines de bernaches du Canada. Une fois arrivé sur place, nous n'avons pas retrouvé l'oiseau; on ne peut pas être chanceux à tous les coups...

Compte-rendu des activités (suite)

RÉSULTATS DU DÉCOMPTE DE NOËL (17 DÉCEMBRE 2017)								
Espèces/Zones	A	B	C	D	E	F	G	TOTAL
alouette hausse-col		26			1	77	10	114
bernache du canada	21	20	77	5				123
bruant chanteur		1		1				2
bruant hudsonien	18	18		19	3	16	3	77
buse à queue rousse	2			3		2	1	8
canard colvert	124	40	124	1				289
canard noir	2		20	2				24
cardinal rouge	5			8				13
carouge à épaulettes	2	1		3		30		36
chardonneret jaune	10	22		32	3		3	70
cormoran à aigrettes			1					1
corneille d'amérique	37	34	13	35		15	15	149
dindon sauvage	16		8			2		26
épervier de cooper	2							2
étourneau sansonnet	26	74	1	7		20	12	140
FAUCON PÈLERIN			2					2
filigule milouinan			2					2
garrot à oeil d'or			7	1				8
geai bleu	17	34	1	28	6	18	7	111
goéland argenté	18		45	2				65
goéland à bec cerclé		10						10
goéland marin	2	1	3					6
grand corbeau	1	1		2			2	6
grand harle		5	8	8				21
grand héron			1					1
GRAND PIC	2		3	1				6
harle couronné	4		3					7
junco ardoisé	46	44		44	1		14	149
merle d'amérique						1		1
mésange à tête noire	18	52	10	21	1	9	7	118
moineau domestique	43	56		29		6	22	156
oie des neiges			1	3				4
pic chevelu	2	1						3
PIC FLAMBOYANT		2						2
pic mineur	5		2	3		1		11
pigeon biset	393	50		145	70	122	118	898
plectrophane des neiges		40		80	25	479	485	1109
plectrophnae lapon						1	1	2
plongeon huard			1					1
PYGARGUE À TÊTE BLANCHE			4					4
quiscale bronzé	1							1
roselin familier		35						35
sittelle à poitrine blanche	5	1	1					7
tourterelle triste	25	42		63				130
vacher à tête brune	4		1	36				41
NOMBRE D'INDIVIDUS	851	610	339	582	110	799	700	3991
NOMBRE D'ESPÈCES	28	24	24	26	8	15	14	45

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

HIVER-PRINTEMPS 2018



**VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES**

Samedi 13 janvier St-Lazare et St-Clet

Les régions de St-Clet et de St-Lazare seront parcourues afin d'y dénicher Harfang des neiges, éperviers, buses, Alouette hausse-col, Plectrophane des neiges, Plectrophane lapon, Perdrix grise et Dindon sauvage.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 8h00

Durée de l'activité : 4 heures

Guide: Alain Quenneville (514) 425-5499

Dimanche 11 février Les canards hivernants

Nous nous efforcerons de dénicher les diverses espèces de canards qui passent l'hiver parmi nous et qui sont présents sur les différents cours d'eau de la région.

Lieu du rendez-vous: Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 8h00

Durée de l'activité : 4 heures

Guide: Denis Gervais (450) 371-6514

Mercredi 21 février

CONFÉRENCE

Le Faucon émerillon

Description page 20

Rendez-vous : Édifice Raphaël-Barrette, 222 Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, à 19h30

Samedi 24 mars Ste-Barbe et environs

Le printemps est arrivé. Eh oui! Les canards et les oies arrivent et font une halte de quelques semaines à Sainte-Barbe et les environs. Des surprises pourraient bien être au rendez-vous.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 8h00

Durée de l'activité : 4 heures

Guide: Alain Quenneville (514) 425-5499

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

HIVER-PRINTEMPS 2018

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Mercredi 28 mars

CONFÉRENCE

Les oiseaux extrêmes

Description page 21

Rendez-vous : Édifice Raphaël-Barrette, 222 Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, à 19h30

Dimanche 15 avril
De Sainte-Catherine à Beauharnois

C'est la deuxième fois que nous offrons cette sortie. Alors, nous nous attendons à plein de surprises. Canards, oies et rapaces seront présents, tout comme les premiers passereaux, comme les bruants. Peut-être verrons-nous quelques hirondelles.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 8h00

Durée de l'activité : 4 heures

Guide: Alain Quenneville (514) 425-5499

Samedi 28 avril
Réserve du Lac St-François

C'est notre pèlerinage annuel de fin du mois d'avril. À cette date, les Grues du Canada sont arrivées. Plusieurs autres espèces qui fréquentent les marais sont aussi présentes, comme le Butor d'Amérique. Peut-être qu'une paruline sera là.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 7h00

Durée de l'activité : 7 heures

Guide: Denis Gervais (450) 371-6514

Samedi 5 mai
Les îles Mgr Langlois

Les Îles Mgr Langlois sont situées dans le fleuve Saint-Laurent et rassemblent une diversité d'habitats propices à l'observation d'une variété d'espèces d'oiseaux, autant aquatiques que forestiers.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 7h00

Durée de l'activité : 5 heures

Guide: Denis Gervais (450) 371-6514

Nos conférences

Conférence sur le suivi d'une nidification de **Faucon émerillon**



Une conférence de
Lucien Lemay



Nos conférences

Conférence sur les oiseaux les plus extraordinaires et bizarres du monde

Présentée par Régis Fortin



Colibri d'Elena

Le plus petit oiseau du monde

Pays: Cuba

Lagopède des saules

L'oiseau ayant le camouflage le plus efficace


Localisation: régions arctiques circumpolaires





Résultats des excursions 2017

Alouette hausse-col	x	Durbec des sapins		Junco ardoisé	x	Petit duc maculé	
Arlequin plongeur		Engoulevent bois-pourri		Macreuse à front blanc	x	Petit Fuligule	x
Autour des palombes		Épervier brun		Macreuse à bec jaune	x	Petit Garrot	x
Balbuzard pêcheur	x	Épervier de Cooper	x	Macreuse brune	x	Petite Buse	x
Bécasse d'Amérique		Érismature rousse		Marouette de Caroline		Pic à tête rouge	x
Bécasseau à poitrine cendrée	x	Étourneau sansonnet	x	Martinet ramoneur	x	Pic à ventre roux	x
Bécasseau minuscule		Faucon émerillon	x	Martin-pêcheur d'Amérique	x	Pic chevelu	x
Bécasseau semipalmé	x	Faucon pèlerin	x	Maubèche des champs	x	Pic flamboyant	x
Bécasseau variable		Foulque d'Amérique		Merle d'Amérique	x	Pic maculé	x
Bécassin roux		Fuligule à collier	x	Merlebleu de l'Est		Pic mineur	x
Bécassine de Wilson	x	Fuligule à dos blanc	x	Mésange à tête noire	x	Pic Tridactyle	
Bec-croisé bifascié		Fuligule milouinan	x	Mésange bicolore	x	Pie-grièche grise	x
Bernache cravant		Gallinule d'Amérique		Moineau domestique	x	Pigeon biset	x
Bernache de Hutchins	x	Garrot à œil d'or	x	Moqueur chat	x	Pioui de l'Est	x
Bernache du Canada	x	Garrot d'Islande		Moqueur polyglotte		Piranga écarlate	x
Bihoreau gris	x	Geai bleu	x	Moqueur roux	x	Plectropane des neiges	x
Bruant à couronne blanche	x	Gélinotte huppée	x	Moucherolle à cotés olive		Plectropane lapon	
Bruant à gorge blanche	x	Goéland à bec cerclé	x	Moucherolle à ventre jaune		Plongeon catmarin	x
Bruant chanteur	x	Goéland argenté	x	Moucherolle des aulnes	x	Plongeon huard	x
Bruant de Lincoln		Goéland bourgmestre	x	Moucherolle des saules	x	Pluvier kildir	x
Bruant des champs	x	Goéland marin	x	Moucherolle phébi	x	Pluvier semipalmé	
Bruant des marais	x	Goglu des prés	x	Moucherolle tchébec	x	Pygargue à tête blanche	x
Bruant des prés	x	Grand Chevalier	x	Mouette de Bonaparte		Quiscale bronzé	x
Bruant familial	x	Grand Corbeau	x	Mouette tridactyle		Quiscale rouilleux	x
Bruant fauve		Grand cormoran		Oie de Ross	x	Râle de Virginie	x
Bruant hudsonien	x	Grand Harle	x	Oie des neiges	x	Râle jaune	
Bruant sauterelle		Grand Héron	x	Oie des neiges forme bleue		Roitelet à couronne dorée	x
Busard des marais	x	Grand pic	x	Oriole de Baltimore	x	Roitelet à couronne rubis	x
Buse à épauettes	x	Grand-duc d'Amérique		Oriole des vergers		Roselin familial	x
Buse à queue rousse	x	Grande Aigrette	x	Paruline des pins		Roselin pourpré	
Buse pattue		Grèbe à bec bigarré	x	Paruline à ailes bleues		Sarcelle à ailes bleues	x
Butor d'Amérique	x	Grèbe esclavon		Paruline à ailes dorées	x	Sarcelle d'hiver	x
Canard branchu	x	Grèbe jougris	x	Paruline à collier		Sitelle à poitrine rousse	
Canard chipeau	x	Grimpereau brun	x	Paruline à croupion jaune	x	Sitelle à poitrine blanche	x
Canard colvert	x	Grive à dos olive		Paruline à flancs marron	x	Sizerin flammé	
Canard d'Amérique	x	Grive des bois	x	Paruline à gorge noire		Sterne caspienne	x
Canard noir	x	Grive fauve	x	Paruline à gorge orangée	x	Sterne pierregarin	x
Canard pilelet		Grive solitaire	x	Paruline à joues grises		Stumelle des prés	x
Canard souchet		Gros-bec errant		Paruline à poitrine baie	x	Tarin des pins	
Cardinal à poitrine rose	x	Grue du Canada	x	Paruline à tête cendrée	x	Tohi à flancs roux	x
Cardinal rouge	x	Guifette noire	x	Paruline bleue		Tourterelle triste	x
Carouge à épauettes	x	Harelde kakawi		Paruline couronnée	x	Troglodyte à bec court	x
Carouge à tête jaune		Harfang des neiges	x	Paruline des ruisseaux	x	Troglodyte de Caroline	x
Chardonneret jaune	x	Harle couronné	x	Paruline flamboyante	x	Troglodyte des forêts	x
Chevalier grivelé	x	Harle huppé	x	Paruline jaune	x	Troglodyte des marais	x
Chevalier solitaire		Héron vert	x	Paruline masquée	x	Troglodyte familial	x
Chouette lapone		Hibou moyen-duc		Paruline noir et blanc	x	Tyrann huppé	x
Chouette rayée		Hirondelle à ailes hérissées		Paruline obscure	x	Tyrann tritri	x
Colibri à gorge rubis	x	Hirondelle à front blanc	x	Paruline rayée	x	Urubu à tête rouge	x
Cormoran à aigrettes	x	Hirondelle bicolore	x	Paruline tigrée		Vacher à tête brune	x
Corneille d'Amérique	x	Hirondelle de rivage		Paruline verdâtre		Viréo à gorge jaune	
Coulicou à bec noir	x	Hirondelle noire	x	Passerin indigo	x	Viréo à tête bleue	x
Crécerelle d'Amérique	x	Hirondelle rustique	x	Perdrix grise		Viréo aux yeux rouges	x
Cygne tuberculé	x	Jaseur boréal		Petit Blongios		Viréo de Philadelphie	
Dindon sauvage	x	Jaseur d'Amérique	x	Petit Chevalier	x	Viréo mélodieux	x
TOTAL: 154 espèces							



Règlements et suggestions pour les activités

L'équipement

En plus de votre guide d'identification et de vos jumelles, assurez-vous de porter des vêtements et des chaussures de circonstance et de prévoir de la nourriture et des breuvages en fonction de la durée de l'activité.

Le covoiturage

Nous encourageons vivement le covoiturage lors des excursions. Il est de mise que chaque participant qui profitera de la voiture d'un autre lui verse une contribution de 0,05 \$ du kilomètre.

Les invités

Si vous avez un ami ou un parent qui s'intéresse aux oiseaux, vous pouvez l'inviter à participer à une activité sans obligation de sa part. Les frais sont de 5 \$.

Les enfants

L'observation des oiseaux est un magnifique loisir pour les enfants. Cependant, pour des raisons de sécurité, les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés d'un adulte.

Votre guide

Votre guide est là pour animer et diriger le groupe tout au long de la journée. N'hésitez pas à le questionner et à lui faire part de vos commentaires et suggestions. N'oubliez pas que votre guide est un membre qui a eu la gentillesse d'animer bénévolement votre excursion. Il est responsable des allées et venues du groupe et de l'application des règles d'éthique.

Vous aimez les oiseaux ?

Abonnez-vous au magazine QuébecOiseaux !

Une revue sans but lucratif publiée par le Regroupement QuébecOiseaux

Être abonné c'est :

- découvrir et partager la passion des oiseaux
- posséder un outil pédagogique et des références de qualité
- recevoir à domicile une revue exceptionnelle à un prix abordable
- aider à faire connaître et protéger les oiseaux du Québec.



Je veux m'abonner au magazine QuébecOiseaux

☐ 22,95 \$ - 4 numéros (1 an) ☐ Nouvel abonnement

☐ 39,95 \$ - 8 numéros (2 ans) ☐ Renouvellement

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Code Postal : _____

Payable à : Regroupement QuébecOiseaux

☐ Chèque ☐ Mandat poste ☐ MasterCard ☐ Visa

No de carte : _____

Date d'expiration : _____

Signature : _____

OU abonnez-vous en ligne à www.quebecoiseaux.org